

ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт»

МЦД МЛ

Информационные материалы по мониторингу морского ледяного покрова Арктики и Южного Океана на основе данных ледового картирования и пассивного микроволнового зондирования SSMR-SSM/I-SSMIS-AMSR<sub>2</sub>

25.01.2016 - 02.02.2016

*Контактная информация:*

лаб. МЦДМЛ ААНИИ, тел. +7(812)337-3149, эл.почта: [vms@aari.aq](mailto:vms@aari.aq)

Адрес в сети Интернет: <http://wdc.aari.ru/datasets/doo42/>

## Содержание

Северное Полушарие .....	3
Рисунок 1а – Обзорная ледовая карта СЛО и повторяемость кромки за текущую неделю .....	3
Рисунок 1б – Положение кромки льда и зон разреженных и сплоченных льдов СЛО за последний доступный срок на основе ледового анализа НЛЦ США .....	4
Рисунок 2а – Общая сплоченность морского льда СЛО и субарктических морей по данным AMSR2 за последний доступный .....	5
Рисунок 2б – Общая сплоченность морского льда морей СМП по данным AMSR2 за последний доступный срок .....	6
Рисунок 3 – Обзорная ледовая карта СЛО за текущую неделю и аналогичные периоды 2007-2014 гг. .	8
Рисунок 4 – Поля распределения средневзвешенной толщины льда на основе совместной модели морского льда – океана ACNFS за текущие сутки и 2010-2014 гг. ....	9
Таблица 1 – Динамика изменения значений ледовитости для акваторий Северной полярной области за текущую неделю по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS .....	10
Таблица 2 - Медианные значения ледовитости для Северной полярной области и 3-х меридиональных секторов за текущие 30 и 7-дневные интервалы и её аномалии от 2009-2014 гг. и интервалов 2005-2015 гг. и 1978-2015 гг. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS .....	10
Таблица 3 – Экстремальные и средние значения ледовитости для Северной полярной области и 3 меридиональных секторов за текущий 7-дневный интервал по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM.....	11
Рисунок 5 – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости для Северной Полярной Области и её трех меридиональных секторов за период с 26.10.1978 по текущий момент времени по годам. ..	12
Рисунок 6 – Медианные распределения сплоченности льда за текущие 7 и 30 дневные интервалы времени и её разности относительно медианного распределения за те же промежутки за 1978-2015 и 2005-2015гг. на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS,алгоритм NASATEAM .	14
Южный океан .....	15
Рисунок 7а – Ледовая карта Южного Океана за последний доступный срок (окраска по общей сплоченности .....	15
Рисунок 7б – Ледовая карта Южного Океана за последний доступный срок на (окраска по наиболее старому возрасту) .....	16
Рисунок 7в – Положение кромки льда и зон разреженных и сплоченных льдов Южного Океана за последний доступный срок на основе ледового анализа НЛЦ США .....	17
Рисунок 8 – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости Южного Океана и его трёх меридиональных секторов за период с 26.10.1978 по текущий момент времени по годам .....	18
Рисунок 9 – Медианные распределения общей сплоченности льда за текущие 7 и 30 дневные интервалы времени и её разности относительно медианного распределения за те же промежутки за периоды 1978-2015 и 2005-2015 гг. на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS .....	18
Таблица 4 – Динамика изменения значений ледовитости для акваторий Южного океана за текущий 7-дневный интервал по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS .....	19
Таблица 5 - Медианные значения ледовитости для Южного океана и 3 меридиональных секторов за текущие 30 и 7-дневные интервалы и её аномалии от 2009-2014 гг. и интервалов 2005-2015 гг. и 1978-2015 гг. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM.....	19
Таблица 6 – Экстремальные и средние значения ледовитости для Южного океана и 3 меридиональных секторов за текущий 7-дневный интервал по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM.....	19
Приложение 1 – Статистические значения ледовитостей по отдельным акваториям Северной Полярной Области и Южного океана.....	20
Таблица 7 – Средние, аномалии среднего и экстремальные значения ледовитостей для Северной полярной области и её отдельных акваторий за текущие 7 и 30 дневные промежутки времени по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM за период 1978-2015 гг.....	20
Таблица 8 – Средние, аномалии среднего и экстремальные значения ледовитостей для Южного океана и его отдельных акваторий за текущие 7 и 30 дневные интервалы времени по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM за период 1978-2015 гг.....	22
Таблица 9 – Динамика изменения значений ледовитости для акваторий Северной полярной области и Южного океана за текущую неделю по данным наблюдений SSMIS.....	24
Характеристика исходного материала и методика расчетов .....	25

# Северное Полушарие




Рисунок 1а – Обзорная ледовая карта СЛО за 25.01 - 02.02.2016 г. на основе ледового анализа Национального ледового центра США (28.01), Канадской ледовой службы (25.01), положение метеорологической дрейфующих буев IABP и Argos на 02.02.2016T1200+00 и повторяемость кромки за 26-31.01 за период 1979-2012 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM).




Рисунок 16 – Положение кромки льда и зон разреженных ( $<8/10$ ) и сплоченных ( $\geq 8/10$ ) льдов СЮ за 01.02.2016 г. на основе ледового анализа Национального Ледового Центра США, положение метеорологический дрейфующих буев IABP и Argos на 02.02.2016Т1200+00 и повторяемость кромки за 01-05.02 за период 1979-2012 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM)




Рисунок 2а – Общая сплоченность морского льда СЛО и субарктических морей по данным NCEP на 02.02.2016 00:00 UTC и границы районов ГМССБ МЕТЗОН XIII, XX и XXI.




Рисунок 2б – Общая сплоченность морского льда морей СМП по данным NCEP на 02.02.2016 00:00 UTC и границы районов ГМССБ МЕТЗОН XX и XXI.

2016-02-02 00:00 UTC Распределение общей сплоченности по данным NCEP




Рисунок 2в – Общая сплоченность морского льда дальневосточных морей по данным NCEP на 02.02.2016 00:00 UTC и границы районов ГМССБ МЕТЗОНЫ XIII.




Рисунок 2г – Общая сплоченность морского льда Каспийского моря по данным NCEP на 02.02.2016 00:00 UTC и границы районов ГМССБ.




Рисунок 2д – Общая сплоченность морского льда Азовского моря по данным NCEP на 02.02.2016 00:00 UTC и границы районов ГМССБ.






Рисунок 3 – Обзорная ледовая карта СЮ за 25.01 - 02.02.2016 г. и аналогичные периоды 2007-2015 гг. на основе ледового Канадской ледовой службы и Национального ледового центра США.


ARCc0.08-04.1 Ice Thickness (m): 20160202




ARCc0.08-03.9 Ice Thickness (m): 20150202




2016-02-02  
ARCc0.08-03.8 Ice Thickness (m): 20140202




2015-02-02  
ARCc0.08-03.5 Ice Thickness: 20130202



2014-02-02  
ARCc0.08-03.5 Ice Thickness: 20120202



2013-02-02  
ARCc0.08-03.5 Ice Thickness: 20110202



2012-02-02

2011-02-02

Рисунок 4 – Поля распределения средневзвешенной толщины льда на основе совместной модели морского льда – океана ACNFS (HYCOM/NCODA/CICE) 02 февраля 2016 - 2011 гг.

Таблица 1 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Северной полярной области за 25 – 31 января 2016 г. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS-AMSR2

Регион	Северная полярная область	Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря)	Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское)	Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика)	Северный Ледовитый океан	Моря СМП (моря Карское-Чукотское)
Разность	161.3	-152.0	135.2	178.1	-119.0	-8.5
тыс.кв.км/сут.	23.0	-21.7	19.3	25.4	-17.0	-1.2

Таблица 2 - Медианные значения ледовитости для Северной полярной области, 3-х меридиональных секторов и моря СМП за текущие 30 и 7-дневные интервалы и её аномалии от 2011-2015 гг. и интервалов 2006-2016 гг. и 1978-2016 гг. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS-AMSR2, алгоритмы NASATEAM/BOOTSTRAP

Северная полярная область								
Месяц	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%						
		2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2006-2016гг	1978-2016гг
01-31.01	13482.0	40.1	-220.4	-184.3	-149.1	-87.6	-209.0	-947.2
		0.3	-1.6	-1.3	-1.1	-0.6	-1.5	-6.6
25-31.01	13872.3	-18.7	-86.2	-375.1	-287.1	-107.9	-248.8	-999.4
		-0.1	-0.6	-2.6	-2.0	-0.8	-1.8	-6.7
Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря)								
Месяц	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%						
		2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2006-2016гг	1978-2016гг
01-31.01	2860.1	-586.6	52.4	-71.1	-214.8	-330.3	-199.9	-644.7
		-17.0	1.9	-2.4	-7.0	-10.4	-6.5	-18.4
25-31.01	2927.3	-577.2	83.4	-271.2	-190.0	-321.9	-203.9	-659.4
		-16.5	2.9	-8.5	-6.1	-9.9	-6.5	-18.4
Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское)								
Месяц	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%						
		2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2006-2016гг	1978-2016гг
01-31.01	4416.2	183.4	-114.1	-102.4	138.4	303.8	17.8	-114.5
		4.3	-2.5	-2.3	3.2	7.4	0.4	-2.5
25-31.01	4605.0	120.1	1.5	-75.8	-42.2	312.2	5.8	-132.7
		2.7	0.0	-1.6	-0.9	7.3	0.1	-2.8
Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика)								
Месяц	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%						
		2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2006-2016гг	1978-2016гг
01-31.01	6205.8	443.4	-158.7	-10.8	-72.6	-61.1	-26.8	-188.0
		7.7	-2.5	-0.2	-1.2	-1.0	-0.4	-2.9
25-31.01	6340.0	438.3	-171.1	-28.1	-54.9	-98.2	-50.6	-207.3
		7.4	-2.6	-0.4	-0.9	-1.5	-0.8	-3.2
Северный Ледовитый океан								
Месяц	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%						
		2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2006-2016гг	1978-2016гг
01-31.01	11258.8	-335.4	29.0	-40.0	-193.6	-358.6	-170.7	-573.8
		-2.9	0.3	-0.4	-1.7	-3.1	-1.5	-4.8
25-31.01	11304.7	-439.4	52.0	-223.6	-156.6	-382.4	-187.1	-593.2
		-3.7	0.5	-1.9	-1.4	-3.3	-1.6	-5.0
Моря СМП (моря Карское-Чукотское)								
Месяц	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%						
		2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2006-2016гг	1978-2016гг
01-31.01	2974.2	-51.7	9.1	-26.2	-51.4	-51.7	-29.5	-44.7
		-1.7	0.3	-0.9	-1.7	-1.7	-1.0	-1.5
25-31.01	2993.4	-32.5	50.6	-32.0	-32.5	-32.5	-14.9	-26.7
		-1.1	1.7	-1.1	-1.1	-1.1	-0.5	-0.9

Таблица 3 – Экстремальные и средние значения ледовитости для Северной полярной области, 3 меридиональных секторов и моря СМП за текущий 7-дневный интервал по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS-AMSR2, алгоритмы NASATEAM/BOOTSTRAP

Северная полярная область

Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
25-31.01	13630.7 25.01.2006	16009.7 30.01.1979	14871.7	14906.5

Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря)

Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
25-31.01	2765.7 25.01.2006	4555.9 30.01.1979	3586.7	3583.1

Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское)

Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
25-31.01	4256.9 30.01.2015	5262.5 31.01.1979	4737.7	4779.6

Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика)


Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
25-31.01	5845.5 26.01.2011	7201.6 31.01.1993	6547.3	6524.1

Северный Ледовитый океан


Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
25-31.01	11110.1 25.01.2006	12696.5 30.01.1979	11897.9	11906.6

Моря СМП (моря Карское-Чукотское)


Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
25-31.01	2918.8 31.01.2012	3025.9 25.01.1979	3020.1	3025.9




а)



б)



в)



г)





Рисунок 5 – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости для Северной Полярной Области и трех меридиональных секторов за период 26.10.1978 - 31.01.2016 по годам на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS-AMSR2, алгоритмы NASATEAM/BOOTSTRAP: а) Северная полярная область, б) сектор 45°W-95°E (Гренландское – Карское моря), в) сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых – Чукотское и Берингово, Охотское), г) сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика), д) Северный Ледовитый океан, е) Северный морской путь (Карское - Чукотское моря).




Рисунок 6 – Медианные распределения сплоченности льда за текущие 7 и 30-дневные промежутки и её разности относительно медианного распределения за те же месяца за периоды 1979-2016 (центр) и 2006-2016 гг. (справа) на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS-AMSR2, алгоритмы NASATEAM/BOOTSTRAP.

# Южный океан




Рисунок 7а – Ледовая карта Южного океана (цветовая окраска по общей сплоченности) и расположение крупных айсбергов на основе информации совместного ледового анализа НЛЦ США, ААНИИ и НМИ (Норвегия) за 28.01.2016.




Рисунок 7б – Ледовая карта Южного океана (цветовая окраска по возрасту) и расположение крупных айсбергов на основе информации совместного ледового анализа НЛЦ США, ААНИИ и НМИ (Норвегия) за 28.01.2016.







Рисунок 7в – Положение кромки льда и зон разреженных ( $<8/10$ ) и сплоченных ( $\geq 8/10$ ) льдов Южного океана за 01.02.2016 г. на основе ледового анализа Национального Ледового Центра США, положение метеорологической дрейфующих буев IABP и Argos на 02.02.2016T1200+00 и повторяемость кромки за 01-05.02 за период 1979-2014 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM)




а)



б)



в)



г)

Рисунок 8 – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости Южного Океана и меридиональных секторов за период 26.10.1978 – 31.01.2016 по годам на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS-AMSR2, алгоритм NASATEAM/BOOTSTRAP: а) Южный Океан, б) Атлантический сектор (60°W-30°E, море Уэдделла), в) Индоокеанский сектор (30°E-150°E, моря Космонавтов, Содружества, Моусона), г) Тихоокеанский сектор (150°E-60°W, моря Росса, Беллингаузена)




Рисунок 9 – Медианные распределения общей сплоченности льда за текущие 7 и 30-дневные промежутки (слева) и её разности относительно медианного распределения за тот же месяц за периоды 1978-2016 (центр) и 2006-2016 гг. (справа) на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS-AMSR2, алгоритм NASATEAM/BOOTSTRAP

Таблица 4 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Южного океана за 25 – 31 января 2016 г. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS

Регион	Южный Океан	Атлантический сектор	Индookeанский сектор	Тихookeанский сектор
Разность	-462.6	-145.9	-84.7	-232.0
тыс.кв.км/сут.	-66.1	-20.8	-12.1	-33.1

Таблица 5 - Медианные значения ледовитости для Южного океана и 3 меридиональных секторов за текущие 30 и 7-дневные интервалы и её аномалии от 2011-2015 гг. и интервалов 2006-2016 гг. и 1978-2016 гг. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS-AMSR2, алгоритм NASATEAM/BOOTSTRAP

Южный Океан

Месяц	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%						
		2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2006-2016гг	1978-2016гг
01-31.01	4703.3	194.4	-956.1	-840.6	-1623.3	-2135.4	-716.0	-400.5
		4.3	-16.9	-15.2	-25.7	-31.2	-13.2	-7.8
25-31.01	3408.1	285.6	-1028.7	-1065.9	-1403.0	-1300.1	-597.0	-465.0
		9.1	-23.2	-23.8	-29.2	-27.6	-14.9	-12.0

Атлантический сектор (60°W-30°E, море Уэдделла)

Месяц	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%						
		2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2006-2016гг	1978-2016гг
01-31.01	2142.9	600.2	-733.6	-333.7	-812.1	-1052.9	-209.3	89.6
		38.9	-25.5	-13.5	-27.5	-32.9	-8.9	4.4
25-31.01	1583.8	206.1	-579.9	-400.1	-946.7	-875.9	-236.8	6.9
		15.0	-26.8	-20.2	-37.4	-35.6	-13.0	0.4

Индookeанский сектор (30°E-150°E, моря Космонавтов, Содружества, Моусона)

Месяц	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%						
		2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2006-2016гг	1978-2016гг
01-31.01	645.3	-171.6	-28.2	-229.6	-397.7	-313.4	-187.3	-111.0
		-21.0	-4.2	-26.2	-38.1	-32.7	-22.5	-14.7
25-31.01	500.7	-67.1	27.9	-243.6	-378.1	-296.6	-169.1	-101.0
		-11.8	5.9	-32.7	-43.0	-37.2	-25.2	-16.8

Тихookeанский сектор (150°E-60°W, моря Росса, Беллинсгаузена)

Месяц	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%						
		2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2006-2016гг	1978-2016гг
01-31.01	1915.0	-234.2	-192.7	-277.0	-413.5	-769.1	-319.2	-379.0
		-10.9	-9.1	-12.6	-17.8	-28.7	-14.3	-16.5
25-31.01	1323.6	146.6	-476.6	-422.2	-78.2	-127.6	-191.1	-370.9
		12.5	-26.5	-24.2	-5.6	-8.8	-12.6	-21.9

Таблица 6 – Экстремальные и средние значения ледовитости для Южного океана и 3 меридиональных секторов за текущий 7-дневный интервал по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS-AMSR2, алгоритм NASATEAM/BOOTSTRAP

Южный Океан

Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
25-31.01	2952.9 31.01.2006	5096.9 25.01.2014	3873.1	3773.6

Атлантический сектор (60°W-30°E, море Уэдделла)

Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
25-31.01	880.2 31.01.1988	2632.3 25.01.2014	1576.9	1531.5

Индookeанский сектор (30°E-150°E, моря Космонавтов, Содружества, Моусона)

Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
25-31.01	424.3 29.01.1980	917.1 27.01.2008	601.7	584.3

Тихookeанский сектор (150°E-60°W, моря Росса, Беллинсгаузена)

Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
25-31.01	1096.3 31.01.2011	2292.4 25.01.1982	1694.4	1737.4

**Приложение 1 – Статистические значения ледовитостей по отдельным акваториям Северной Полярной Области и Южного океана**

Таблица 7 – Средние, аномалии среднего и экстремальные значения ледовитостей для Северной полярной области и её отдельных акваторий за текущие 7-дневный (неделя) и 30-дневный промежутки времени по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS-AMSR2, алгоритм NASATEAM/BOOTSTRAP за период 1978-2016 гг.

25-31.01

Регион	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%							1978-2016гг			
		2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2006-2016гг	1978-2016гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Сев. полярная область	13872.3	-18.7	-86.2	-375.1	-287.1	-107.9	-248.8	-999.4	13630.7	16009.7	14871.7	14906.5
		-0.1	-0.6	-2.6	-2.0	-0.8	-1.8	-6.7	25.01.2006	30.01.1979		
<b>Сектор 45°W-95°E</b>	2927.3	-577.2	83.4	-271.2	-190.0	-321.9	-203.9	-659.4	2765.7	4555.9	3586.7	3583.1
		-16.5	2.9	-8.5	-6.1	-9.9	-6.5	-18.4	25.01.2006	30.01.1979		
Гренландское море	582.8	-150.0	-53.8	-115.1	-10.9	13.0	-75.4	-208.8	549.6	1096.8	791.6	753.6
		-20.5	-8.4	-16.5	-1.8	2.3	-11.5	-26.4	27.01.2015	30.01.1997		
Баренцево море	398.6	-242.7	31.9	-62.6	-113.4	-283.9	-87.6	-308.3	266.8	1121.0	706.9	725.9
		-37.8	8.7	-13.6	-22.1	-41.6	-18.0	-43.6	25.01.2006	31.01.1979		
Карское море	806.6	-32.6	50.6	-32.0	-32.6	-32.6	-14.9	-26.7	732.1	839.2	833.4	839.2
		-3.9	6.7	-3.8	-3.9	-3.9	-1.8	-3.2	31.01.2012	25.01.1979		
<b>Сектор 95°E-170°W</b>	4605.0	120.1	1.5	-75.8	-42.2	312.2	5.8	-132.7	4256.9	5262.5	4737.7	4779.6
		2.7	0.0	-1.6	-0.9	7.3	0.1	-2.8	30.01.2015	31.01.1979		
Море Лаптевых	674.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	673.6	674.3	674.3	674.3
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.01.1995	25.01.1979		
Восточно-Сибирское море	915.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	914.5	915.1	915.1	915.1
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.01.1994	25.01.1979		
Чукотское море	597.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	596.7	597.3	597.3	597.3
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.01.1999	25.01.1979		
Берингово море	573.3	-120.7	-338.3	-204.3	30.2	88.5	-132.7	-99.9	374.8	944.9	673.2	677.4
		-17.4	-37.1	-26.3	5.6	18.3	-18.8	-14.8	25.01.1979	28.01.2012		
<b>Сектор 170°W-45°W</b>	6340.0	438.3	-171.1	-28.1	-54.9	-98.2	-50.6	-207.3	5845.5	7201.6	6547.3	6524.1
		7.4	-2.6	-0.4	-0.9	-1.5	-0.8	-3.2	26.01.2011	31.01.1993		
Море Бофорта	486.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	485.9	486.6	486.6	486.6
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.01.1996	25.01.1979		
Гудзонов залив	837.0	-2.0	-1.9	-1.9	-2.0	-1.9	-1.8	-1.9	836.6	839.0	838.9	839.0
		-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	27.01.2016	25.01.1979		
Море Лабрадор	267.1	246.8	49.9	58.3	-59.2	-11.4	51.1	0.4	6.3	521.0	266.7	260.4
		1213.0	22.9	27.9	-18.1	-4.1	23.7	0.2	26.01.2011	25.01.1984		
Дейвисов пролив	465.6	192.6	11.8	59.4	85.2	25.7	46.6	12.9	247.9	698.6	452.7	440.5
		70.6	2.6	14.6	22.4	5.9	11.1	2.8	26.01.2011	25.01.1984		
Канадский архипелаг	1190.0	14.9	-0.1	-0.1	-0.1	0.6	1.3	0.3	1151.5	1190.1	1189.7	1190.1
		1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	25.01.2011	25.01.1979		

01-31.01

Регион	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%							1978-2016гг			
		2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2006- 2016гг	1978- 2016гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Сев. полярная область	13482.0	40.1	-220.4	-184.3	-149.1	-87.6	-209.0	-947.2	12740.9	16009.7	14429.3	14451.6
		0.3	-1.6	-1.3	-1.1	-0.6	-1.5	-6.6	01.01.2016	30.01.1979		
<b>Сектор 45°W- 95°E</b>	2860.1	-586.6	52.4	-71.1	-214.8	-330.3	-199.9	-644.7	2418.0	4555.9	3504.8	3490.6
		-17.0	1.9	-2.4	-7.0	-10.4	-6.5	-18.4	03.01.2016	30.01.1979		
Гренландское море	603.7	-84.8	-6.0	-71.0	-23.5	-9.1	-51.0	-166.0	528.5	1118.5	769.7	729.2
		-12.3	-1.0	-10.5	-3.7	-1.5	-7.8	-21.6	02.01.2016	10.01.1989		
Баренцево море	351.2	-283.6	-10.1	8.6	-151.4	-243.1	-107.0	-327.5	158.9	1121.0	678.8	696.2
		-44.7	-2.8	2.5	-30.1	-40.9	-23.3	-48.3	04.01.2016	31.01.1979		
Карское море	787.5	-51.7	9.1	-26.2	-51.4	-51.7	-29.5	-44.7	704.8	839.2	832.2	839.2
		-6.2	1.2	-3.2	-6.1	-6.2	-3.6	-5.4	04.01.2016	01.01.1979		
<b>Сектор 95°E- 170°W</b>	4416.2	183.4	-114.1	-102.4	138.4	303.8	17.8	-114.5	3819.5	5262.5	4530.7	4529.5
		4.3	-2.5	-2.3	3.2	7.4	0.4	-2.5	01.01.2014	31.01.1979		
Море Лаптевых	674.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	669.1	674.3	674.3	674.3
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.01.1987	01.01.1979		
Восточно- Сибирское море	915.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	914.5	915.1	915.1	915.1
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.01.1999	01.01.1979		
Чукотское море	597.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	595.5	597.3	597.3	597.3
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	06.01.2006	01.01.1979		
Берингово море	479.3	-108.0	-312.3	-218.0	-27.3	149.0	-143.1	-120.6	167.2	978.8	599.9	603.4
		-18.4	-39.5	-31.3	-5.4	45.1	-23.0	-20.1	04.01.2015	10.01.2000		
<b>Сектор 170°W- 45°W</b>	6205.8	443.4	-158.7	-10.8	-72.6	-61.1	-26.8	-188.0	5512.5	7201.6	6393.8	6374.8
		7.7	-2.5	-0.2	-1.2	-1.0	-0.4	-2.9	07.01.2011	31.01.1993		
Море Бофорта	486.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	484.0	486.6	486.6	486.6
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.01.1990	01.01.1979		
Гудзонов залив	836.8	38.6	-2.1	-1.2	-2.1	-2.1	1.8	-0.4	718.3	839.0	837.2	839.0
		4.8	-0.3	-0.1	-0.3	-0.3	0.2	0.0	07.01.2011	01.01.1979		
Море Лабрадор	205.7	187.9	49.2	77.7	-59.1	-35.8	49.6	-5.2	2.6	533.1	211.0	200.6
		1057.0	31.4	60.7	-22.3	-14.8	31.7	-2.5	07.01.2011	24.01.1984		
Дейвисов пролив	437.5	196.1	-20.2	37.4	70.2	19.5	44.5	5.0	186.5	709.4	432.5	419.5
		81.2	-4.4	9.3	19.1	4.7	11.3	1.2	08.01.2011	09.01.1983		
Канадский архипелаг	1190.0	79.5	1.1	-0.1	-0.1	0.0	7.3	2.1	1022.2	1190.1	1187.9	1190.1
		7.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	07.01.2011	01.01.1979		

Таблица 8 – Средние, аномалии среднего и экстремальные значения ледовитостей для Южного океана и его отдельных акваторий за текущие 7-дневный (неделя) и 30-дневный промежутки времени по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS-AMSR2, алгоритм NASATEAM/BOOTSTRAP за период 1978-2016 гг.

25-31.01

Регион	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%							1978-2016гг			
		2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2006-2016гг	1978-2016гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Южный Океан	3408.1	285.6	-1028.7	-1065.9	-1403.0	-1300.1	-597.0	-465.0	2952.9	5096.9	3873.1	3773.6
		9.1	-23.2	-23.8	-29.2	-27.6	-14.9	-12.0	31.01.2006	25.01.2014		
<b>Атлантический сектор</b>	1583.8	206.1	-579.9	-400.1	-946.7	-875.9	-236.8	6.9	880.2	2632.3	1576.9	1531.5
		15.0	-26.8	-20.2	-37.4	-35.6	-13.0	0.4	31.01.1988	25.01.2014		
Западная часть моря Уэдделла	1321.0	225.7	-132.4	-261.1	-461.8	-493.4	-77.2	31.0	832.0	1865.6	1290.0	1265.2
		20.6	-9.1	-16.5	-25.9	-27.2	-5.5	2.4	29.01.1988	25.01.2003		
Восточная часть моря Уэдделла	262.8	-19.6	-447.5	-139.0	-485.0	-382.5	-159.6	-24.1	13.3	796.1	286.9	259.3
		-6.9	-63.0	-34.6	-64.9	-59.3	-37.8	-8.4	29.01.1989	25.01.2014		
<b>Индоокеанский сектор</b>	500.7	-67.1	27.9	-243.6	-378.1	-296.6	-169.1	-101.0	424.3	917.1	601.7	584.3
		-11.8	5.9	-32.7	-43.0	-37.2	-25.2	-16.8	29.01.1980	27.01.2008		
Море Космонавтов	54.5	-128.4	-90.7	-53.7	-81.4	-85.1	-76.7	-75.4	23.5	241.1	129.8	134.2
		-70.2	-62.5	-49.6	-59.9	-61.0	-58.5	-58.1	30.01.1998	25.01.1984		
Море Содружества	119.3	-57.0	59.0	63.9	-196.1	-68.5	-42.5	-1.6	13.5	322.0	121.0	120.2
		-32.3	97.8	115.2	-62.2	-36.5	-26.3	-1.3	30.01.1982	30.01.2014		
Море Моусона	326.9	118.3	59.5	-253.8	-100.5	-143.1	-49.9	-24.0	186.5	602.5	350.9	354.8
		56.7	22.3	-43.7	-23.5	-30.4	-13.2	-6.8	30.01.2000	26.01.2013		
<b>Тихоокеанский сектор</b>	1323.6	146.6	-476.6	-422.2	-78.2	-127.6	-191.1	-370.9	1096.3	2292.4	1694.4	1737.4
		12.5	-26.5	-24.2	-5.6	-8.8	-12.6	-21.9	31.01.2011	25.01.1982		
Море Росса	862.3	-63.1	-558.1	-779.4	-234.3	-415.6	-415.8	-521.4	828.0	2048.2	1383.7	1410.7
		-6.8	-39.3	-47.5	-21.4	-32.5	-32.5	-37.7	31.01.2016	25.01.2008		
Море Беллинсгаузена	461.3	209.7	81.5	357.2	156.1	288.0	224.7	150.5	30.8	574.2	310.8	299.3
		83.4	21.5	343.2	51.2	166.2	95.0	48.4	31.01.2010	26.01.1979		

01-31.01

Регион	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%							1978-2016гг			
		2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2006- 2016гг	1978- 2016гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Южный Океан	4703.3	194.4	-956.1	-840.6	-1623.3	-2135.4	-716.0	-400.5	2952.9	9401.1	5103.8	4928.1
		4.3	-16.9	-15.2	-25.7	-31.2	-13.2	-7.8	31.01.2006	01.01.2015		
<b>Атлантический сектор</b>	2142.9	600.2	-733.6	-333.7	-812.1	-1052.9	-209.3	89.6	880.2	4024.9	2053.3	1974.0
		38.9	-25.5	-13.5	-27.5	-32.9	-8.9	4.4	31.01.1988	01.01.2015		
Западная часть моря Уэдделла	1609.4	417.9	-37.6	-243.2	-341.3	-385.3	2.6	119.3	832.0	2221.7	1490.1	1480.6
		35.1	-2.3	-13.1	-17.5	-19.3	0.2	8.0	29.01.1988	03.01.2013		
Восточная часть моря Уэдделла	533.6	182.4	-696.0	-90.5	-470.8	-667.6	-211.9	-29.7	13.3	2109.5	563.3	465.5
		51.9	-56.6	-14.5	-46.9	-55.6	-28.4	-5.3	29.01.1989	01.01.2012		
<b>Индоокеанский сектор</b>	645.3	-171.6	-28.2	-229.6	-397.7	-313.4	-187.3	-111.0	424.3	1320.3	756.4	735.9
		-21.0	-4.2	-26.2	-38.1	-32.7	-22.5	-14.7	29.01.1980	01.01.2014		
Море Космонавтов	73.9	-226.9	-111.1	-66.7	-101.3	-97.3	-99.4	-92.8	23.5	476.1	166.8	163.4
		-75.4	-60.0	-47.4	-57.8	-56.8	-57.3	-55.7	30.01.1998	01.01.2011		
Море Содружества	167.4	-77.2	43.0	77.2	-180.9	-72.4	-39.5	3.4	13.5	428.5	164.0	149.8
		-31.6	34.5	85.7	-51.9	-30.2	-19.1	2.1	30.01.1982	02.01.2014		
Море Моусона	404.0	132.6	40.1	-240.4	-115.5	-143.7	-48.4	-21.6	186.5	760.1	425.6	429.1
		48.8	11.0	-37.3	-22.2	-26.2	-10.7	-5.1	30.01.2000	01.01.2013		
<b>Тихоокеанский сектор</b>	1915.0	-234.2	-192.7	-277.0	-413.5	-769.1	-319.2	-379.0	1096.3	4177.3	2294.0	2234.2
		-10.9	-9.1	-12.6	-17.8	-28.7	-14.3	-16.5	31.01.2011	01.01.2015		
Море Росса	1397.7	-452.2	-291.4	-556.9	-488.2	-1043.1	-523.5	-526.5	828.0	3780.4	1924.2	1877.9
		-24.4	-17.3	-28.5	-25.9	-42.7	-27.2	-27.4	31.01.2016	01.01.2015		
Море Беллинсгаузена	517.3	217.9	98.7	279.8	74.7	274.0	204.2	147.5	30.8	754.4	369.9	365.8
		72.8	23.6	117.8	16.9	112.6	65.2	39.9	31.01.2010	01.01.1987		

Таблица 9 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Северной полярной области и Южного океана за текущий 7-дневный (неделя) промежуток времени по данным наблюдений SSMIS-AMSR2

25-31.01

Регион	Сев. полярная область	Сектор 45°W-95°E	Гренландское море	Баренцево море
Разность	161.3	-152.0	-79.0	-27.5
тыс.кв.км/ сут.	23.0	-21.7	-11.3	-3.9

25-31.01

Регион	Карское море	Сектор 95°E-170°W	Море Лаптевых	Восточно-Сибирское море
Разность	-8.5	135.2	0.0	0.0
тыс.кв.км/ сут.	-1.2	19.3	0.0	0.0

25-31.01

Регион	Чукотское море	Берингово море	Сектор 170°W-45°W	Море Бофорта
Разность	0.0	59.3	178.1	0.0
тыс.кв.км/ сут.	0.0	8.5	25.4	0.0

25-31.01

Регион	Гудзонов залив	Море Лабрадор	Дейвисов пролив	Канадский архипелаг
Разность	1.1	88.7	55.5	0.4
тыс.кв.км/ сут.	0.2	12.7	7.9	0.1

25-31.01

Регион	Южный Океан	Атлантический сектор	Западная часть моря Уэдделла	Восточная часть моря Уэдделла
Разность	-462.6	-145.9	-164.6	18.7
тыс.кв.км/ сут.	-66.1	-20.8	-23.5	2.7

25-31.01

Регион	Индоокеанский сектор	Море Космонавтов	Море Содружества	Море Моусона
Разность	-84.7	-5.7	-22.5	-56.5
тыс.кв.км/ сут.	-12.1	-0.8	-3.2	-8.1

25-31.01

Регион	Тихоокеанский сектор	Море Росса	Море Беллинсгаузена	
Разность	-232.0	-185.9	-46.1	
тыс.кв.км/ сут.	-33.1	-26.6	-6.6	

## Характеристика исходного материала и методика расчетов

Для иллюстрации ледовых условий Арктического региона представлены совмещенные региональные карты ААНИИ, ГМЦ России, ледовой службы Германии (BSH), Канадской ледовой службы – КЛС и Национального ледового центра США – НЛЦ. Совмещение карт выполнено путем перекрытия слоев (ААНИИ, слой #1), (региональная карта НЛЦ, слой #1), (ГМЦ России, слой #1), (BSH, слой #1) -> (КЛС, слой #2) -> (обзорная карта НЛЦ, слой #3). Как результат, карты ААНИИ характеризуют ледовые условия морей Гренландского...Бофорта и Охотского, карты ГМЦ России – Азовского, Каспийского и Белого, карты НЛЦ – Берингова моря, карты BSH – Балтийского карты КЛС - морей Бофорта, Канадского архипелага, Баффина, Девисова пролива, Лабрадор, Св. Лаврентия, а НЛЦ - Арктического Бассейна, Линкольна, южной части Гренландского моря, а также в летний период – моря Бофорта, Чукотское и Берингово (при этом полный охват карт НЛЦ – вся акватория СЛО и субполярные моря). Для построения совмещенных карт используется архив данных в обменном формате ВМО СИГРИД3 Мирового центра данных по морскому льду (МЦД МЛ). В пределах отдельного срока выборка карт из архива проводилась по критериям близости карт к сроку выпуска карты ААНИИ с максимальным интервалом времени между картами до 7 суток (день недели выпуска карт ААНИИ и ГМЦ России – каждая среда, BSH – каждый понедельник, КЛС – каждый вторник, НЛЦ – 1 раз в 2 недели по вторникам для циркумполярных карт и понедельник – четверг для региональных карт).

Для иллюстрации полей толщин льда СЛО использованы ежедневные данные по распределению средневзвешенной толщины льда численной модели ACNFS. Численная модель ACNFS имеет пространственное разрешение  $1/12^\circ$  и является совместной моделью морского льда – океана диагностики и краткосрочного прогнозирования состояния ледяного покрова всех акваторий Северного полушария севернее  $40^\circ$  с.ш. В модели ACNFS используется ледовый блок CICE (Hunke and Lipscomb, 2008), совмещенный с моделью океана HYCOM (Metzger et al., 2008, 2010). Атмосферный форсинг включает поля приземных метеопараметров и радиационного баланса поверхности. Исходная ледовая информация, используемая для расчетов по модели, включают данные альтиметра, ТПО, сплоченность, профиля температуры и солёности воды.

Для иллюстрации ледовых условий Южного океана, а также Северной Полярной области за последние сутки используются ежедневные циркумполярные ледовые информационные продукты НЛЦ США по оценке расположения кромки льда и ледяных массивов - MIZ (Marginal Ice Zone).

Для цветовой окраски карт использован стандарт ВМО (WMO/Td. 1215) для зимнего (по возрасту) и летнего (по общей сплоченности) периодов. Следует также отметить, что в зонах стыковки карт ААНИИ, ГМЦ России, КЛС и НЛЦ наблюдается определенная несогласованность границ и характеристик ледовых зон вследствие ряда различий в ледовых информационных системах подготавливающих служб (карты для Балтийского моря представлены только BSH или ААНИИ). Однако, данная несогласованность несущественна для целей интерпретации ледовых условий в рамках настоящего обзора.

Для получения оценок ледовитости (extent) и приведенной ледовитости – площади льда (area) отдельных секторов, морей, частей морей Северной полярной области и Южного океана и климатического положения кромок заданной повторяемости на основе данных спутниковых систем пассивного микроволнового зондирования SSMR-SSM/I-SSMIS-AMSR2 в МЦД МЛ ААНИИ принята следующая технология расчетов:

- источник данных – архивные (Cavalieri et al., 2008, Meier et al., 2006) и квазиоперативные (Maslanik and Stroeve, 1999) с задержкой 1-2 дня ежедневные матрицы (поля распределения) оценок общей сплоченности Северной (севернее  $45^\circ$  с.ш.) и Южной (южнее  $50^\circ$  с.ш.) Полярных областей на основе обработанных по алгоритму NASATEAM данных многоканальных микроволновых радиометров SSMR-SSM/I-SSMIS ИСЗ NIMBUS-7 и DMSP за период с 26.10.1978 г. по настоящий момент времени, копируемые с сервера НЦДСЛ;

- источник данных – ежедневные матрицы (поля распределения) оценок общей сплоченности Северной и Южной полярной областей на основе обработанных по алгоритму Bootstrap данных многоканального микроволнового радиометра AMSR2 ИСЗ GCOM-W1(SHIZUKU) за период с 01.07.2012 г. по настоящий момент времени, предоставленные Японским космическим агентством (provided by JAXA);
- область расчета – Северная и Южная Полярные области и их регионы с использованием масок океан/суша НЦДСЛ ([http://nsidc.org/data/polar\\_stereo/tools\\_masks.html](http://nsidc.org/data/polar_stereo/tools_masks.html));
- границы используемых масок расчета отдельных меридиональных секторов, морей, частей морей Северной полярной области и Южного океана представлены на рисунках П1 – П2, не совпадают с используемыми в НЦДСЛ масками для отдельных акваторий Мирового океана и основаны на номенклатуре ААНИИ для морей Евразийского шельфа (Гренландское - Чукотское), Атласе Северного ледовитого океана (1980) и Атласе океанов (1980) издательства ГУНИО МО.
- вычислительные особенности расчета – авторское программное обеспечение ААНИИ с сохранением точности расчетов и оценке статистических параметров по гистограмме распределения и свободно-распространяемое программное обеспечение GDAL для векторизации полей климатических параметров;

Исходная информация в формате ВМО СИГРИЗ доступна на сервере МЦД МЛ по адресам <http://wdc.aari.ru/datasets/d0004> (карты ААНИИ), <http://wdc.aari.ru/datasets/d0031> (карты КЛС), <http://wdc.aari.ru/datasets/d0032> (карты НЛЦ), ), <http://wdc.aari.ru/datasets/d0033> (карты ГМЦ России) и ), <http://wdc.aari.ru/datasets/d0035> (карты BSH).

В графическом формате PNG совмещенные карты ААНИИ-КЛС-НЛЦ доступны по адресу <http://wdc.aari.ru/datasets/d0040>.

Результаты расчетов ледовитости Северной, Южной полярных областей, их отдельных меридиональных секторов, морей и частей морей доступны на сервере МЦД МЛ ААНИИ в каталогах соответственно <http://wdc.aari.ru/datasets/ssmi/data/north/extent/> и <http://wdc.aari.ru/datasets/ssmi/data/south/extent/>.




Рисунок П1 – Секторальное деление северной полярной области. 1 - Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря); 2 - Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика); 3 - Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское, Японское)




Рисунок П2 – Северный ледовитый океан в официальных границах




Рисунок ПЗ – моря северной полярной области. 1 – Арктический бассейн; 2- Баренцево море; 3 – Карское море; 4 – море Лаптевых; 5 - Восточно-Сибирское море; 6 – Чукотское море; 7 – море Бофорта; 8 – Канадский архипелаг; 9 – море Линкольна; 10 – Гренландское море; 11 – Норвежское море; 12 – Балтийское море; 13 – Белое море; 14 – Берингово море; 15 – Охотское море; 16 – Японское море; 17 – море Баффина; 18 – Дейвисов пролив; 19 – море Лабрадор; 20 – залив Святого Лаврентия; 21 – Гудзонов залив.




Рисунок П4 – Сектора и моря северной полярной области. 1 - Белое море; 2- Балтийское море; 3 – Баренцево море (СВ); 4 – Баренцево море (З); 5 - Баренцево море (ЮВ); 6 – Карское море (СВ); 7 – Карское море (ЮЗ); 8 – море Лаптевых (В); 9 – море Лаптевых (З); 10 – Восточно-Сибирское море (З); 11 – Восточно-Сибирское море (В); 12 –Чукотское море; 13 – Берингово море; 14 – Охотское море; 15 –Гренландское море; 16 – Норвежское море; 17 – Канадский архипелаг; 18 – Гудзонов залив; 19 – Дейвисов пролив; 20 - море Баффина; 21 – море Лабрадор; 22 - залив Святого Лаврентия; 23 - море Линкольна; 24 - море Бофорта; 25 - Японское море; 26 - сектор АО (30°з.д. – 10°в.д.); 27 – сектор АО (10°в.д. – 30°в.д.); 28 - сектор АО (30°в.д. – 65°в.д.); 29 - сектор АО (65°в.д. – 96°в.д.);30 - сектор АО (96°в.д. – 140°в.д.);31 - сектор АО (140°в.д. – 180°в.д.); 32 - сектор АО (180°в.д. – 156°з.д.); 33 - сектор АО (156°з.д. – 123°з.д.); 34 - сектор АО (123°з.д. – 30°з.д.).




Рисунок П5 – Секторальное деление Южного океана. 1 - Атлантический сектор (60°W-30°E, море Уэдделла); 2 - Индоокеанский сектор (30°E-150°E, моря Космонавтов, Содружества, Моусона); 3 - Тихоокеанский сектор (150°E-60°W, моря Росса, Беллинсгаузена)




Рисунок П6 – Моря Южного океана. 1 – Западная часть моря Уэдделла; 2- Восточная часть моря Уэдделла; 3 – Море Космонавтов; 4 – море Содружества; 5 – море Моусона; 6 – море Росса; 7 – Море Беллинсгаузена.

## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Атлас океанов. Северный Ледовитый океан. – 1980. М: Изд. ГУНИО МО СССР ВМФ – 184 с.
2. Атлас океанов. Термины. Понятия. Справочные таблицы. - Изд. ВМФ МО СССР.- 1980.
3. Границы океанов и морей. – 1960. Л.: Изд. ГУНИО ВМФ. – 51 с.
4. Andersen, S., R. Tonboe, L. Kaleschke, G. Heygster, and L. T. Pedersen, Intercomparison of passive microwave sea ice concentration retrievals over the high-concentration Arctic sea ice.// J. Geophys. Res. – 2007. – Vol. 112. C08004, doi:10.1029/2006JC003543.
5. Cavalieri, D., C. Parkinson, P. Gloersen, and H. J. Zwally. 1996, updated 2008. *Sea Ice Concentrations from Nimbus-7 SMMR and DMSP SSM/I Passive Microwave Data*, [1978.10.26 – 2007.12.31]. Boulder, Colorado USA: National Snow and Ice Data Center. Digital media.
6. Meier, W., F. Fetterer, K. Knowles, M. Savoie, M. J. Brodzik. 2006, updated quarterly. *Sea Ice Concentrations from Nimbus-7 SMMR and DMSP SSM/I Passive Microwave Data*, [2008.01.01 – 2008.03.25]. Boulder, Colorado USA: National Snow and Ice Data Center. Digital media.
7. Maslanik, J., and J. Stroeve. 1999, updated daily. *Near-Real-Time DMSP SSM/I-SSMIS Daily Polar Gridded Sea Ice Concentrations*, [2008.03.26 – present moment]. Boulder, Colorado USA: National Snow and Ice Data Center. Digital media.
8. Ice Chart Colour Code Standard. - JCOMM Technical Report Series No. 24, 2004, WMO/TD-No.1215.  
([http://jcomm.info/index.php?option=com\\_oe&task=viewDocumentRecord&docID=4914](http://jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=4914))
9. JAXA GCOM-W1 ("SHIZUKU") Data Providing Service - <http://gcom-w1.jaxa.jp/index.html>
10. ACNFS on Internet - <http://www7320.nrlssc.navy.mil/hycomARC>
11. Posey, P.G., E.J. Metzger, A.J. Wallcraft, O.M Smedstad and M.W. Phelps, 2010: [Validation of the 1/12° Arctic Cap Nowcast/Forecast System \(ACNFS\)](#). Naval Report NRL/MR/7320-10-9287, Stennis Space Center, MS.