



Арктический и антарктический научно-исследовательский институт»  
**МЦД МЛ**

Информационные материалы по мониторингу морского ледяного покрова Арктики и Южного Океана на основе данных ледового картирования и пассивного микроволнового зондирования SSMR-SSM/I-SSMIS-AMSR<sub>2</sub>

**22.03.2021 - 30.03.2021**

**№ 13(498)**

**Санкт-Петербург 2021**

тел. +7(812)337-3149, эл. почта: [yms@aari.aq](mailto:yms@aari.aq)

Адрес в сети Интернет: <http://wdc.aari.ru/datasets/do042/>

## Содержание

<b>Северное Полушарие .....</b>	<b>4</b>
Рисунок 1а – Ледовая карта СЛО и повторяемость кромки за текущую неделю (цветовая окраска по общей сплоченности) .....	4
Рисунок 1б – Ледовая карта СЛО и повторяемость кромки за текущую неделю (цветовая окраска по преобладающему возрасту) .....	5
Рисунок 1в – Положение кромки льда и зон разреженных и сплоченных льдов СЛО за последний доступный срок на основе ледового анализа НЛЦ США .....	6
Рисунок 2а – Обзорная ледовая карта СЛО за текущую неделю и аналогичные периоды 2007-2019.7	7
Рисунок 2б – Поля распределения средневзвешенной толщины льда совместной модели морского льда – океана HYCOM/CICE Датского метеорологического института .....	8
Рисунок 2в – Поля распределения средней за 36-часовые промежутки температуры поверхности морского льда и океана Датского метеорологического института .....	9
Рисунок 2г – Поле дрейфа морского льда Арктики по расчетам МЦД МЛ ААНИИ, источник данных EUMETSAT OSISAF, AMSR-2. ....	10
Рисунок 2д – Ежедневные оценки сезонного хода объема морского льда СЛО на основе расчетов средневзвешенной толщины льда совместной модели морского льда – океана HYCOM/CICE Датского метеорологического института.....	11
Рисунок 2е – Аномалии приземной температуры воздуха (2м) и осредненные вектора скорости ветра (10 м) (polarportal.dk).....	12
Таблица 1 – Динамика изменения значений ледовитости для акваторий Северной полярной области за текущую неделю по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS .....	13
Таблица 2 – Медианные значения ледовитости для Северной полярной области и 3-х меридиональных секторов за текущие 30 и 7-дневные интервалы и её аномалии от 2011-2016 гг. и интервалов 2006-2017 гг. и 1978-2017 гг. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS .....	13
Таблица 3 – Экстремальные и средние значения ледовитости для Северной полярной области и 3 меридиональных секторов за текущий 7-дневный интервал по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM.....	13
Рисунок 3а – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости для Северной Полярной Области и её трех меридиональных секторов за период с 26.10.1978 по текущий момент времени по годам..	16
Рисунок 3б – Ежедневные оценки сезонных изменений ледовитости для Северной Полярной Области с 26.10.1978 по текущий момент времени .....	17
Рисунок 4 – Медианные распределения сплоченности льда за текущие 7 дневные промежутки (слева) и её разности относительно медианного распределения за те же промежутки за периоды 1979-2020 (центр) и 2009-2020 гг. (справа) на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритмы NASATEAM.....	Ошибкa! Закладка не определена.
<b>Южный океан .....</b>	<b>18</b>
Рисунок 5 а,б – Ледовая карта Южного Океана за последний доступный срок (окраска по общей сплоченности и преобладающему возрасту).....	19,19
Рисунок 5в – Положение кромки льда и зон разреженных и сплоченных льдов Южного Океана за последний доступный срок на основе ледового анализа НЛЦ США .....	20
Рисунок 5д – Анализ ААНИИ крупных айсбергов Южного океана .....	21
Таблица 4 – Параметры крупных айсбергов Южного океана на основе анализа ААНИИ .....	23
Рисунок 7а – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости Южного Океана и его трёх меридиональных секторов за период с 26.10.1978 по текущий момент времени по годам .....	23
Рисунок 7б – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости Южного Океана и его трёх меридиональных секторов за период с 26.10.1978 по текущий момент времени. ....	24
Рисунок 8 – Медианные распределения общей сплоченности льда за текущие 7 дневные промежутки (слева) и её разности относительно медианного распределения за тот же промежуток за периоды 1979-2020 (центр) и 2009-2020 гг. (справа) на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM.....	Ошибкa! Закладка не определена.
Таблица 5 – Динамика изменения значений ледовитости для акваторий Южного океана за текущий 7-дневный интервал по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS .....	25
Таблица 6 – Медианные значения ледовитости для Южного океана и 3 меридиональных секторов за текущие 30 и 7-дневные интервалы и её аномалии от 2011-2016 гг. и интервалов 2007-2017 гг. и 1978-2017 гг. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM .....	25

Таблица 7 – Экстремальные и средние значения ледовитости для Южного океана и 3 меридиональных секторов за текущий 7-дневный интервал по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM.....	25
<b>Земля в целом</b>	
Рисунок 9 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения ледовитости Арктики, Антарктики и Земли в целом с 26.10.1978 на основе SSMR-SSM/I-SSMIS .....	26
Рисунок 10 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения приведенной ледовитости Арктики, Антарктики и Земли в целом с 26.10.1978 на основе SSMR-SSM/I-SSMIS .....	27
Рисунок 11 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения общей сплоченности Арктики и Антарктики с 26.10.1978 на основе SSMR-SSM/I-SSMIS .....	28
Приложение 1 – Статистические значения ледовитостей по отдельным акваториям Северной Полярной Области и Южного океана .....	29
Таблица 8 – Средние, аномалии среднего и экстремальные значения ледовитостей для Северной полярной области и её отдельных акваторий за текущие 7-дневный (неделя) и 30-дневный промежутки времени по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM за период 1978-2017 гг.....	29
Таблица 9 – Средние, аномалии среднего и экстремальные значения ледовитостей для Южного океана и его отдельных акваторий за текущие 7-дневный и 30-дневный промежутки времени по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM за период 1978-2017 .....	29
Таблица 10 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Северной полярной области и Южного океана за текущий 7-дневный (неделя) промежуток времени по данным наблюдений SSMIS .....	33
Характеристика исходного материала и методика расчетов .....	33
Список источников .....	39

# Северное Полушарие




Рисунок 1а – Обзорная ледовая карта СЛО за 25.03-30.03.2021 г. (цветовая раскраска по общей сплощенности) на основе ледового анализа ААНИИ (30.03), Национального ледового центра США (25.03) и НИЦ Планета (23.03 Каспийское моря) и повторяемость кромки за 26-31.03 за период 1991-2020 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM).




Рисунок 1б – Обзорная ледовая карта СЛО за 25.03-30.03.2021 г. (цветовая раскраска по преобладающему возрасту) на основе ледового анализа ААНИИ (30.03), Национального ледового центра США (25.03) и НИЦ Планета (23.03 Каспийское море) и повторяемость кромки за 26-31.03 за период 1991-2020 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM).




Рисунок 1в – Положение кромки льда и зон разреженных ( $<8/10$ ) и сплошных ( $\geq 8/10$ ) льдов СЛО за 30.03.2021 г. на основе ледового анализа Национального Ледового Центра США и повторяемость кромки за 26-31.03 за период 1991-2020 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM)




Рисунок 2а – Обзорная ледовая карта СЛО за 25.03-30.03.2021 г и аналогичные периоды 2007-2020гг. на основе ледового анализа ААНИИ, НИЦ Планета, Канадской ледовой службы и Национального ледового центра США.




Рисунок 26 – Поля распределения средневзвешенной толщины льда совместной модели морского льда – океана HYCOM/CICE Датского метеорологического института 17.02.2004-29.03.2021 гг.




Рисунок 2в – Поля распределения средней за 36-часовые промежутки температуры поверхности морского льда и океана Датского метеорологического института на основе статистической обработки ИК-каналов AVHRR ИСЗ MetOp-A за 27.03-29.03 2018-2021 гг. (<http://polarportal.dk/en/sea-ice-and-icebergs/sea-ice-temperature/#c8099>)

## Ice drift speed for 20210322T1200-20210329T1200




Рисунок 2г – Поле дрейфа морского льда Арктики за 22.03-29.03.2021 г., источник данных EUMETSAT OSISAF.

### Arctic Sea Ice Volume, 29-Mar-2021





Рисунок 2д – Ежедневные оценки сезонного хода объема морского льда СЛО на основе расчетов средневзвешенной толщины льда совместной модели морского льда – океана HYCOM/CICE Датского метеорологического института с 01.01.2004 по 29.03.2021 гг.

Mar 25 to Mar 29, 2021



Mar 25 to Mar 29, 2020




Рисунок 2е – Аномалии приземной температуры воздуха (2м) и осредненные вектора скорости ветра (10 м) за 25.03 - 29.03.2021 гг. относительно периода 2004-2013 гг. (<http://polarportal.dk>)

Таблица 1 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Северной полярной области 15.03 – 21.03.2021 г. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SMIS

Регион	Северная полярная область	Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря)	Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское)	Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика)	Северный Ледовитый океан	Моря СМП (моря Карское-Чукотское)
Разность	-160.0	-114.6	-118.7	73.3	-115.1	0.0
тыс.кв.км/сут.	-22.9	-16.4	-17.0	10.5	-16.4	0.0

Таблица 2 - Медианные значения ледовитости для Северной полярной области, 3-х меридиональных секторов и моря СМП за текущие 30 и 7-дневные интервалы и её аномалии от 2012-2016 гг. и интервалов 2007-2017 гг. и 1978-2017 гг. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритмы NASATEAM

#### Северная полярная область

Месяц	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%						
		2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2011-2021гг	1978-2021гг
01-28.03	14918.2	477.9	627.5	605.4	312.2	-167.7	239.6	-445.8
		3.3	4.4	4.2	2.1	-1.1	1.6	-2.9
22-28.03	14803.2	311.6	677.1	537.5	391.6	72.1	219.5	-462.0
		2.1	4.8	3.8	2.7	0.5	1.5	-3.0

#### Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря)

Месяц	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%						
		2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2011-2021гг	1978-2021гг
01-28.03	3485.5	570.4	291.3	250.0	86.8	61.3	200.8	-181.2
		19.6	9.1	7.7	2.6	1.8	6.1	-4.9
22-28.03	3424.9	348.2	284.9	144.4	113.3	12.5	112.8	-241.4
		11.3	9.1	4.4	3.4	0.4	3.4	-6.6

#### Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское)

Месяц	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%						
		2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2011-2021гг	1978-2021гг
01-28.03	4945.0	-45.7	461.8	254.6	96.8	67.6	131.3	-34.4
		-0.9	10.3	5.4	2.0	1.4	2.7	-0.7
22-28.03	4827.3	-28.4	485.3	124.4	9.0	188.5	95.8	-98.3
		-0.6	11.2	2.6	0.2	4.1	2.0	-2.0

#### Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика)

Месяц	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%						
		2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2011-2021гг	1978-2021гг
01-28.03	6487.7	-46.9	-125.7	100.7	128.6	-296.6	-92.5	-230.2
		-0.7	-1.9	1.6	2.0	-4.4	-1.4	-3.4
22-28.03	6551.0	-8.3	-93.1	268.7	269.3	-129.0	10.9	-122.3
		-0.1	-1.4	4.3	4.3	-1.9	0.2	-1.8

#### Северный Ледовитый океан


Месяц	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%						
		2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2011-2021гг	1978-2021гг
01-28.03	11796.1	468.2	190.6	237.6	6.6	11.6	154.6	-150.2
		4.1	1.6	2.1	0.1	0.1	1.3	-1.3
22-28.03	11732.8	239.8	174.8	92.7	13.5	-66.1	49.3	-223.4
		2.1	1.5	0.8	0.1	-0.6	0.4	-1.9

#### Моря СМП (моря Карское-Чукотское)


Месяц	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%						
		2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2011-2021гг	1978-2021гг
01-28.03	3025.9	11.4	30.7	0.3	1.5	1.0	9.2	2.9
		0.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1
22-28.03	3025.9	0.0	85.4	0.0	0.9	1.3	12.0	4.0
		0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1

Таблица 3 – Экстремальные и средние значения ледовитости для Северной полярной области, 3 меридиональных секторов и моря СМП за текущий 7-дневный интервал по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритмы NASATEAM


Северная полярная область				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
22-28.03	14079.6 23.03.2017	16423.9 22.03.1979	15266.7	15331.9
Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря)				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
22-28.03	3022.0 28.03.2016	4518.5 25.03.1979	3667.1	3665.4
Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское)				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
22-28.03	4318.7 24.03.2017	5438.9 22.03.1979	4925.9	4937.6
Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика)				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
22-28.03	6153.4 22.03.2005	7276.8 26.03.1993	6673.6	6654.5
Северный Ледовитый океан				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
22-28.03	11459.5 28.03.2016	12674.8 23.03.1979	11957.0	11945.9
Моря СМП (моря Карское-Чукотское)				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
22-28.03	2936.2 28.03.2017	3025.9 22.03.1979	3021.9	3025.9




а)



б)



в)



г)





Рисунок За – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости для Северной Полярной Области и трех меридиональных секторов за период 26.10.1978 - 21.03.2021 по годам на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритмы NASATEAM: а) Северная полярная область, б) сектор 45°W-95°E (Гренландское – Карское моря), в) сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых – Чукотское и Берингово, Охотское), г) сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика), д) Северный Ледовитый океан, е) Северный морской путь (Карское - Чукотское моря).




Рисунок 3б – Ежедневные оценки сезонных изменений ледовитости для Северной Полярной Области за период 26.10.1978 – 21.03.2021 на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM.

# Южный океан




Рисунок 5а – Ледовая карта Южного океана (цветовая окраска по общей сплощенности) и расположение крупных айсбергов на основе информации совместного ледового анализа НЛЦ США, ААНИИ и НМИ (Норвегия) за 25.03.2021.




Рисунок 56 – Ледовая карта Южного океана (цветовая окраска по возрасту) и расположение крупных айсбергов на основе информации совместного ледового анализа НЛЦ США, ААНИИ и НМИ (Норвегия) за 25.03.2021.




Рисунок 5в – Положение кромки льда и зон разреженных ( $<8/10$ ) и сплоченных ( $\geq 8/10$ ) льдов Южного океана за 29.03.2021 г. на основе ледового анализа Национального Ледового Центра США и повторяемость кромки за 26-31.03 за период 1991-2020 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM).






Рисунок 5д – Анализ ААНИИ крупных айсбергов Южного океана за 21.03.2021.

Таблица 4 – Линейные размеры крупных айсбергов Южного океана на основе анализа ААНИИ за 25.02.2021 / Table 4 – Southern Ocean tabular icebergs linear dimensions based on AARI analysis for 2021-02-25


Имя/ Name	Длина/ Length км/км	Ширина/ Width км/км	Площадь/ Area кв.км/sq.km	Имя/ Name	Длина/ Length км/км	Ширина/ Width км/км	Площадь/ Area кв.км/sq.km
A23A	74	63	3996	C36	41	28	147
D15A	94	44	3587	D27	15	9	147
B22A	70	44	3192	A63	20	6	144
D28	54	35	1743	A68K	19	4	142
D15B	61	22	1185	B45	13	11	141
A68A	67	24	894	B42	22	7	138
B09B	44	15	603	A68I	35	6	122
D20A	35	17	455	B46	19	7	111
A64	24	17	346	B15AB	20	7	109
C15	22	15	341	B29	20	9	108
A68E	48	13	334	B39	15	7	105
C21B	20	15	317	A68P	48	11	99
A68M	54	19	287	A68N	48	11	97
A69A	19	17	264	C30	17	6	93
C18B	35	7	243	C33	15	7	88
B50	28	11	232	B38	11	7	87
B09I	22	11	211	C24	20	4	85
B09G	20	13	200	C31	17	6	84
B28	17	11	196	C29	9	9	83
B47	22	9	182	B37	15	6	82
A73	17	9	181	A71	15	6	72
A72	20	7	172	B40	11	9	71
A69B	19	13	169	A68G	48	11	64
D23	15	11	164	B49	19	9	60
A70	15	9	159	A68J	24	4	56
D26	35	4	149	A68O	48	11	55
D21B	19	7	147	A68H	20	9	31
C35	13	9	147	A68P	24	4	11




a)



в)



б)



г)

Рисунок 7а – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости Южного Океана и меридиональных секторов за период 26.10.1978 – 21.03.2021 по годам на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM: а) Южный Океан, б) Атлантический сектор ( $60^{\circ}\text{W}$ - $30^{\circ}\text{E}$ , море Уэдделла), в) Индоокеанский сектор ( $30^{\circ}\text{E}$ - $150^{\circ}\text{E}$ , моря Космонавтов, Содружества, Моусона), г) Тихоокеанский сектор ( $150^{\circ}\text{E}$ - $60^{\circ}\text{W}$ , моря Росса, Беллинсгаузена)




Рисунок 7б – Ежедневные оценки сезонных изменений ледовитости для Южного океана за период 26.10.1978 – 21.03.2021 на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM.

Таблица 5 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Южного океана за 15.03.2021 - 21.03.2021 г. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS

Регион	Южный Океан	Атлантический сектор	Индоокеанский сектор	Тихоокеанский сектор
Разность	602.6	141.5	203.7	257.5
тыс.кв.км/сут.	86.1	20.2	29.1	36.8

Таблица 6 - Медианные значения ледовитости для Южного океана и 3 меридиональных секторов за текущие 30 и 7-дневные интервалы и её аномалии от 2012-2016 гг. и интервалов 2007-2017 гг. и 1978-2017 гг. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM

#### Южный Океан

Месяц	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%						
		2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2011-2021гг	1978-2021гг
01-28.03	4309.2	486.3	1691.1	911.0	1230.8	528.6	388.4	417.8
		12.7	64.6	26.8	40.0	14.0	9.9	10.7
22-28.03	5147.5	175.5	1999.8	694.6	1415.6	486.2	377.8	444.0
		3.5	63.5	15.6	37.9	10.4	7.9	9.4

#### Атлантический сектор (60°W-30°E, море Уэдделла)

Месяц	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%						
		2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2011-2021гг	1978-2021гг
01-28.03	1326.8	-282.3	-97.1	-116.2	-128.8	-178.2	-386.1	-202.9
		-17.5	-6.8	-8.1	-8.8	-11.8	-22.5	-13.3
22-28.03	1438.2	-364.6	-144.1	-75.5	-166.9	-201.0	-444.6	-302.9
		-20.2	-9.1	-5.0	-10.4	-12.3	-23.6	-17.4

#### Индоокеанский сектор (30°E-150°E, моря Космонавтов, Содружества, Моусона)

Месяц	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%						
		2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2011-2021гг	1978-2021гг
01-28.03	699.9	97.7	117.7	-37.2	230.4	-82.6	11.0	117.1
		16.2	20.2	-5.0	49.1	-10.6	1.6	20.1
22-28.03	972.2	17.4	262.7	-37.3	375.2	-51.1	56.3	213.5
		1.8	37.0	-3.7	62.9	-5.0	6.1	28.1

#### Тихоокеанский сектор (150°E-60°W, моря Росса, Беллинсгаузена)

Месяц	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%						
		2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2011-2021гг	1978-2021гг
01-28.03	2282.5	670.9	1670.5	1064.4	1129.1	789.4	763.5	503.6
		41.6	272.9	87.4	97.9	52.9	50.3	28.3
22-28.03	2737.1	522.7	1881.2	807.5	1207.2	738.3	766.2	533.5
		23.6	219.8	41.8	78.9	36.9	38.9	24.2

Таблица 7 – Экстремальные значения ледовитости для Южного океана и 3 меридиональных секторов за текущий 7-дневный интервал по Южный Океан

#### Южный Океан

Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.			Медиана	
			2016 г	2017 г	2018 г		
22-28.03	2954.7 22.03.2017	6182.5 28.03.2008				4702.0	4695.0

#### Атлантический сектор (60°W-30°E, море Уэдделла)

Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.			Медиана	
			2016 г	2017 г	2018 г		
22-28.03	1010.2 22.03.1999	2716.3 28.03.2015				1742.2	1670.4

#### Индоокеанский сектор (30°E-150°E, моря Космонавтов, Содружества, Моусона)

Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.			Медиана	
			2016 г	2017 г	2018 г		
22-28.03	357.6 22.03.1986	1216.6 27.03.2008				758.0	728.7

#### Тихоокеанский сектор (150°E-60°W, моря Росса, Беллинсгаузена)

Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.			Медиана	
			2016 г	2017 г	2018 г		
22-28.03	773.8 22.03.2017	3045.2 28.03.1987				2201.8	2247.5




Рисунок 9 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения ледовитости (площади распространения морского льда) Арктики, Антарктики и Земли в целом с 26.10.1978 по 21.03.2021 на основе SSMR-SSM/I-SSMIS




Рисунок 10 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения приведенной ледовитости (площади морского льда) Арктики, Антарктики и Земли в целом с 26.10.1978 по 21.03.2021 на основе SSMR-SSM/I-SSMIS




Рисунок 11 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения средней общей сплоченности Арктики и Антарктики с 26.10.1978 по 21.03.2021 на основе SSMR-SSM/I-SSMIS

**Приложение 1 – Статистические значения ледовитостей по отдельным акваториям Северной Полярной Области и Южного океана**

Таблица 8 – Средние, аномалии среднего и экстремальные значения ледовитостей для Северной полярной области и её отдельных акваторий за текущие 7-дневный (неделя) и 30-дневный промежутки времени по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM за период 1978-2020 гг.

22-28.03

Регион	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%							1978-2021гг			
		2007 г	2012 г	2016 г	2019 г	2020 г	2011-2021гг	1978-2021гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Сев. полярная область	14803.2	343.3	-332.3	311.6	391.6	72.1	219.5	-462.0	14079.6 23.03.2017	16423.9 22.03.1979	15266.7	15331.9
		2.4	-2.2	2.1	2.7	0.5	1.5	-3.0				
Сектор 45°W- 95°E	3424.9	291.8	267.7	348.2	113.3	12.5	112.8	-241.4	3022.0 28.03.2016	4518.5 25.03.1979	3667.1	3665.4
		9.3	8.5	11.3	3.4	0.4	3.4	-6.6				
Гренландское море	731.3	25.1	57.4	106.1	63.4	3.7	43.0	-69.2	550.6 25.03.2018	1054.3 23.03.1988	800.7	765.4
		3.6	8.5	17.0	9.5	0.5	6.2	-8.6				
Баренцево море	668.9	238.9	166.8	207.3	37.7	-27.4	53.9	-92.8	400.5 25.03.2007	1209.3 23.03.1979	762.1	759.1
		55.6	33.2	44.9	6.0	-3.9	8.8	-12.2				
Карское море	839.2	13.8	17.3	0.0	0.9	1.3	12.0	4.0	749.5 28.03.2017	839.2 22.03.1979	835.2	839.2
		1.7	2.1	0.0	0.1	0.2	1.4	0.5				
Сектор 95°E- 170°W	4827.3	137.8	-337.8	-28.4	9.0	188.5	95.8	-98.3	4318.7 24.03.2017	5438.9 22.03.1979	4925.9	4937.6
		2.9	-6.5	-0.6	0.2	4.1	2.0	-2.0				
Море Лаптевых	674.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	674.3 22.03.1979	674.3 22.03.1979	674.3	674.3
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Восточно- Сибирское море	915.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	915.1 22.03.1979	915.1 22.03.1979	915.1	915.1
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Чукотское море	597.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	596.7 22.03.1989	597.3 22.03.1979	597.3	597.3
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Берингово море	604.3	-273.0	-436.9	-57.0	223.3	80.6	-33.0	-135.3	250.0 28.03.2019	1094.4 27.03.2008	740.0	733.4
		-31.1	-42.0	-8.6	58.6	15.4	-5.2	-18.3				
Сектор 170°W- 45°W	6551.0	-86.3	-262.2	-8.3	269.3	-129.0	10.9	-122.3	6153.4 22.03.2005	7276.8 26.03.1993	6673.6	6654.5
		-1.3	-3.8	-0.1	4.3	-1.9	0.2	-1.8				
Море Бофорта	486.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	486.6 22.03.1979	486.6 22.03.1979	486.6	486.6
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Гудзонов залив	837.2	-1.8	-1.6	0.0	0.0	0.0	-0.6	-1.4	829.3 28.03.1990	839.0 22.03.1979	838.6	839.0
		-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.2				
Море Лабрадор	207.3	-74.7	-150.5	-149.1	-29.5	-65.6	-54.9	-85.9	101.2 22.03.1981	526.0 28.03.1983	293.4	305.5
		-26.5	-42.1	-41.8	-12.4	-24.0	-20.9	-29.3				
Дейвисов пролив	470.7	38.7	-142.7	24.8	39.2	16.9	-19.5	-32.4	349.7 22.03.2005	710.0 23.03.1993	503.2	489.4
		9.0	-23.3	5.6	9.1	3.7	-4.0	-6.4				
Канадский архипелаг	1190.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	1186.0 26.03.2001	1190.1 22.03.1979	1190.0	1190.1
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				

01-28.03

Регион	S, тыс. км <sup>2</sup>	Аномалии, тыс км <sup>2</sup> /%							1978-2021гг			
		2007 г	2012 г	2016 г	2019 г	2020 г	2011- 2021гг	1978- 2021гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Сев. полярная область	14918.2	280.1 1.9	-239.5 -1.6	477.9 3.3	312.2 2.1	-167.7 -1.1	239.6 1.6	-445.8 -2.9	14079.6 23.03.2017	16769.3 01.03.1979	15364.4	15416.7
Сектор 45°W-95°E	3485.5	244.4 7.5	385.9 12.5	570.4 19.6	86.8 2.6	61.3 1.8	200.8 6.1	-181.2 -4.9	2769.8 13.03.2016	4645.7 01.03.1979	3666.9	3665.4
Гренландское море	709.7	17.4 2.5	21.3 3.1	96.6 15.8	54.2 8.3	11.6 1.7	32.2 4.8	-88.3 -11.1	550.6 25.03.2018	1103.7 01.03.1979	798.1	764.0
Баренцево море	739.3	223.8 43.4	296.2 66.8	378.3 104.8	34.8 4.9	49.2 7.1	151.8 25.8	-10.7 -1.4	266.0 15.03.2016	1209.3 23.03.1979	750.0	755.6
Карское море	839.2	6.0 0.7	31.7 3.9	11.4 1.4	0.2 0.0	1.0 0.1	9.1 1.1	2.9 0.3	749.5 28.03.2017	839.2 01.03.1979	836.3	839.2
Сектор 95°E-170°W	4945.0	154.9 3.2	-278.6 -5.3	-45.7 -0.9	96.8 2.0	67.6 1.4	131.3 2.7	-34.4 -0.7	4318.7 24.03.2017	5550.2 04.03.2001	4979.4	4980.1
Море Лаптевых	674.3	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	673.6 03.03.1989	674.3 01.03.1979	674.3	674.3
Восточно-Сибирское море	915.1	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	914.5 01.03.2006	915.1 01.03.1979	915.1	915.1
Чукотское море	597.3	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.2	1.2 0.0	0.0 0.0	0.1 0.0	0.0 0.0	587.6 05.03.2019	597.3 01.03.1979	597.3	597.3
Берингово море	611.4	-190.9 -23.8	-440.6 -41.9	-28.1 -4.4	309.0 102.2	-86.4 -12.4	-35.7 -5.5	-120.1 -16.4	144.5 05.03.2019	1116.2 20.03.2012	731.7	734.6
Сектор 170°W-45°W	6487.7	-119.2 -1.8	-346.8 -5.1	-46.9 -0.7	128.6 2.0	-296.6 -4.4	-92.5 -1.4	-230.2 -3.4	6142.1 21.03.2005	7276.8 26.03.1993	6718.1	6720.5
Море Баффорта	486.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	485.9 18.03.2006	486.6 01.03.1979	486.6	486.6
Гудзонов залив	837.2	-1.8 -0.2	-1.5 -0.2	0.2 0.0	0.5 0.1	0.3 0.0	-0.5 -0.1	-1.5 -0.2	825.2 13.03.2019	839.0 01.03.1979	838.6	839.0
Море Лабрадор	181.0	-61.7 -25.4	-166.2 -47.9	-188.1 -51.0	-78.3 -30.2	-83.4 -31.5	-91.1 -33.5	-123.1 -40.5	101.2 22.03.1981	526.0 28.03.1983	304.2	318.6
Дейвисов пролив	436.6	20.4 4.9	-181.4 -29.4	-22.4 -4.9	16.3 3.9	-12.3 -2.7	-48.7 -10.0	-64.9 -12.9	285.3 15.03.2005	719.3 21.03.1993	501.6	488.5
Канадский архипелаг	1190.1	0.0 0.0	0.2 0.0	0.0 0.0	0.5 0.0	0.0 0.0	0.1 0.0	0.0 0.0	1182.5 20.03.2019	1190.1 01.03.1979	1190.1	1190.1

Таблица 9 – Средние, аномалии среднего и экстремальные значения ледовитостей для Южного океана и его отдельных акваторий за текущие 7-дневный (неделя) и 30-дневный промежутки времени по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM за период 1978-2017 гг.

22-28.03

Регион	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%							1978-2021гг			
		2007 г	2012 г	2016 г	2019 г	2020 г	2011- 2021гг	1978- 2021гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Южный Океан	5147.5	863.1	-104.4	175.5	1415.6	486.2	377.8	444.0	2954.7 22.03.2017	6182.5 28.03.2008	4702.0	4695.0
		20.1	-2.0	3.5	37.9	10.4	7.9	9.4				
Атлантический сектор	1438.2	-113.4	-690.4	-364.6	-166.9	-201.0	-444.6	-302.9	1010.2 22.03.1999	2716.3 28.03.2015	1742.2	1670.4
		-7.3	-32.4	-20.2	-10.4	-12.3	-23.6	-17.4				
Западная часть моря Уэдделла	1209.0	-64.7	-372.3	-241.2	-36.1	-93.1	-253.2	-165.9	848.8 22.03.1999	1932.1 25.03.2015	1375.5	1320.2
		-5.1	-23.5	-16.6	-2.9	-7.2	-17.3	-12.1				
Восточная часть моря Уэдделла	229.2	-48.6	-318.1	-123.4	-130.8	-107.9	-191.4	-137.0	24.4 27.03.2005	805.9 28.03.2015	366.7	348.0
		-17.5	-58.1	-35.0	-36.3	-32.0	-45.5	-37.4				
Индоокеанский сектор	972.2	189.3	184.4	17.4	375.2	-51.1	56.3	213.5	357.6 22.03.1986	1216.6 27.03.2008	758.0	728.7
		24.2	23.4	1.8	62.9	-5.0	6.1	28.1				
Море Космонавтов	140.3	-12.3	19.0	96.1	41.5	6.8	37.4	60.3	5.6 26.03.1998	200.0 26.03.2011	79.8	60.1
		-8.1	15.7	217.1	42.0	5.1	36.3	75.3				
Море Содружества	370.4	0.2	94.3	15.1	296.6	37.9	67.1	114.7	48.1 22.03.2003	455.8 27.03.2008	255.3	254.0
		0.0	34.2	4.2	402.0	11.4	22.1	44.8				
Море Моусона	461.5	201.4	71.0	-93.7	37.1	-95.8	-48.2	38.5	136.5 28.03.1980	718.7 28.03.2013	422.9	424.5
		77.5	18.2	-16.9	8.7	-17.2	-9.5	9.1				
Тихоокеанский сектор	2737.1	787.1	401.7	522.7	1207.2	738.3	766.2	533.5	773.8 22.03.2017	3045.2 28.03.1987	2201.8	2247.5
		40.4	17.2	23.6	78.9	36.9	38.9	24.2				
Море Росса	2505.7	729.5	534.5	626.5	1189.1	636.0	743.0	544.9	676.2 22.03.2017	2822.5 28.03.1999	1958.9	2000.3
		41.1	27.1	33.3	90.3	34.0	42.2	27.8				
Море Беллинсгаузена	231.4	57.5	-132.8	-103.8	18.0	102.3	23.2	-11.5	10.7 27.03.2013	535.2 26.03.1980	242.9	240.4
		33.1	-36.5	-31.0	8.5	79.2	11.2	-4.7				

01-28.03

Регион	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%							1978-2021гг			
		2007 г	2012 г	2016 г	2019 г	2020 г	2011- 2021гг	1978- 2021гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Южный Океан	4309.2	564.7	-34.7	486.3	1230.8	528.6	388.4	417.8	2080.6 01.03.2017	6182.5 28.03.2008	3891.1	3837.9
		15.1	-0.8	12.7	40.0	14.0	9.9	10.7				
Атлантический сектор	1326.8	-90.5	-646.8	-282.3	-128.8	-178.2	-386.1	-202.9	776.5 04.03.1981	2716.3 28.03.2015	1529.9	1492.2
		-6.4	-32.8	-17.5	-8.8	-11.8	-22.5	-13.3				
Западная часть моря Уэдделла	1123.2	-87.0	-376.4	-190.9	-39.2	-120.1	-257.0	-140.1	766.3 05.03.1999	1932.1 25.03.2015	1263.4	1241.7
		-7.2	-25.1	-14.5	-3.4	-9.7	-18.6	-11.1				
Восточная часть моря Уэдделла	203.6	-3.5	-270.4	-91.5	-89.6	-58.1	-129.1	-62.8	0.6 08.03.1989	805.9 28.03.2015	266.5	238.8
		-1.7	-57.0	-31.0	-30.5	-22.2	-38.8	-23.6				

<b>Индоокеанский сектор</b>	699.9	<b>55.3</b>	<b>138.0</b>	<b>97.7</b>	<b>230.4</b>	<b>-82.6</b>	<b>11.0</b>	<b>117.1</b>	190.6 02.03.1980	1216.6 27.03.2008	582.7	558.7
		<b>8.6</b>	<b>24.6</b>	<b>16.2</b>	<b>49.1</b>	<b>-10.6</b>	<b>1.6</b>	<b>20.1</b>				
Море Космонавтов	149.0	<b>2.5</b>	<b>40.6</b>	<b>117.9</b>	<b>36.7</b>	<b>17.0</b>	<b>51.1</b>	<b>70.7</b>	5.6 26.03.1998	207.3 09.03.2011	78.3	67.4
		<b>1.7</b>	<b>37.4</b>	<b>379.1</b>	<b>32.6</b>	<b>12.9</b>	<b>52.2</b>	<b>90.2</b>				
Море Содружества	252.6	<b>-25.0</b>	<b>106.4</b>	<b>33.5</b>	<b>227.7</b>	<b>18.1</b>	<b>53.3</b>	<b>83.9</b>	0.0 08.03.1988	455.8 27.03.2008	168.5	162.6
		<b>-9.0</b>	<b>72.8</b>	<b>15.3</b>	<b>917.8</b>	<b>7.7</b>	<b>26.8</b>	<b>49.8</b>				
Море Моусона	298.3	<b>77.9</b>	<b>-8.9</b>	<b>-53.8</b>	<b>-34.0</b>	<b>-117.6</b>	<b>-93.5</b>	<b>-37.5</b>	64.5 12.03.1986	718.7 28.03.2013	335.9	342.1
		<b>35.3</b>	<b>-2.9</b>	<b>-15.3</b>	<b>-10.2</b>	<b>-28.3</b>	<b>-23.9</b>	<b>-11.2</b>				
<b>Тихоокеанский сектор</b>	2282.5	<b>599.9</b>	<b>474.0</b>	<b>670.9</b>	<b>1129.1</b>	<b>789.4</b>	<b>763.5</b>	<b>503.6</b>	404.7 07.03.2017	3045.2 28.03.1987	1778.5	1790.1
		<b>35.7</b>	<b>26.2</b>	<b>41.6</b>	<b>97.9</b>	<b>52.9</b>	<b>50.3</b>	<b>28.3</b>				
Море Росса	2045.1	<b>547.7</b>	<b>499.6</b>	<b>739.5</b>	<b>1106.9</b>	<b>666.4</b>	<b>702.6</b>	<b>482.2</b>	267.2 01.03.2017	2822.5 28.03.1999	1562.5	1586.6
		<b>36.6</b>	<b>32.3</b>	<b>56.6</b>	<b>118.0</b>	<b>48.3</b>	<b>52.3</b>	<b>30.9</b>				
Море Беллинсгаузена	237.4	<b>52.2</b>	<b>-25.6</b>	<b>-68.6</b>	<b>22.2</b>	<b>123.0</b>	<b>60.9</b>	<b>21.4</b>	10.7 27.03.2013	535.2 26.03.1980	215.9	204.5
		<b>28.2</b>	<b>-9.7</b>	<b>-22.4</b>	<b>10.3</b>	<b>107.6</b>	<b>34.5</b>	<b>9.9</b>				

Таблица 10 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Северной полярной области и Южного океана за текущий 7-дневный (неделя) промежуток времени по данным наблюдений SSMIS

22-28.03				
Регион	Сев. полярная область	Сектор 45°W-95°E	Гренландское море	Баренцево море
Разность	-160.0	-114.6	30.3	-117.4
тыс.кв.км/ сут.	-22.9	-16.4	4.3	-16.8
22-28.03				
Регион	Карское море	Сектор 95°E-170°W	Море Лаптевых	Восточно-Сибирское море
Разность	0.0	-118.7	0.0	0.0
тыс.кв.км/ сут.	0.0	-17.0	0.0	0.0
22-28.03				
Регион	Чукотское море	Берингово море	Сектор 170°W-45°W	Море Бофорта
Разность	0.0	17.9	73.3	0.0
тыс.кв.км/ сут.	0.0	2.6	10.5	0.0
22-28.03				
Регион	Гудзонов залив	Море Лабрадор	Дейвисов пролив	Канадский архипелаг
Разность	0.0	25.0	22.1	-0.1
тыс.кв.км/ сут.	0.0	3.6	3.2	0.0
22-28.03				
Регион	Южный Океан	Атлантический сектор	Западная часть моря Уэдделла	Восточная часть моря Уэдделла
Разность	602.6	141.5	85.5	55.9
тыс.кв.км/ сут.	86.1	20.2	12.2	8.0
22-28.03				
Регион	Индоокеанский сектор	Море Космонавтов	Море Содружества	Море Моусона
Разность	203.7	-17.9	94.2	127.3
тыс.кв.км/ сут.	29.1	-2.6	13.5	18.2
22-28.03				
Регион	Тихоокеанский сектор	Море Росса	Море Беллинсгаузена	
Разность	257.5	282.8	-25.3	
тыс.кв.км/ сут.	36.8	40.4	-3.6	

## **Характеристика исходного материала и методика расчетов**

Для иллюстрации ледовых условий Арктического региона представлены совмещенные региональные карты ААНИИ [4, 6], Канадской ледовой службы – КЛС [12], Национального ледового центра США – НЛЦ [10], при наличии данных, ГМЦ России [8], НИЦ Планета [9] и ледовой службы Германии. Совмещение карт выполнено путем перекрытия слоев (ААНИИ, слой #1), (ГМЦ России или НИЦ Планета, слой #1), (BSH, слой #1) -> (КЛС, слой #2) -> (обзорная карта НЛЦ, слой #3). Как результат, карты ААНИИ характеризуют ледовые условия морей Гренландского...Бофорта, карты ГМЦ России или НИЦ Планета – Азовского, Каспийского, Берингова, Охотского, Японского, Белого, карты НЛЦ – Северных частей Тихого и Атлантического океанов и Арктического бассейна (при этом полный охват карт НЛЦ – вся акватория СЛО и субполярные моря). карты BSH – Балтийского карты КЛС - морей Бофорта, Канадского архипелага, Баффина, Девисова пролива, Лабрадор, Св. Лаврентия (при этом полный охват карт НЛЦ – вся акватория СЛО и субполярные моря). Для ледовых условий и распределения айсбергов Южного океана использованы данные проекта по интегрированному ледовому анализу Южного океана – циркумполярные карты ААНИИ [5, 7], НЛЦ [10, 11] и карты акватории Антарктического полуострова Норвежского метеорологического института (НМИ) [21]. Для построения совмещенных карт используется архив данных в обменном формате ВМО СИГРИД-3 [18] Мирового центра данных по морскому льду (МЦД МЛ) – проекта ВМО «Глобальный Банк Цифровых Данных по Морскому Льду». В пределах отдельного срока выборка карт из архива проводилась по критериям близости карт к сроку выпуска карты ААНИИ с максимальным интервалом времени между картами до 7 суток (день недели выпуска карт ААНИИ – вторник, ГМЦ России – среда, НИЦ Планета – понедельник, BSH – понедельник, КЛС – понедельник, НЛЦ – четверг для морского льда и пятница – для крупных айсбергов Южного океана, НМИ - понедельник).

Для иллюстрации полей толщин льда СЛО использованы ежедневные данные по распределению средневзвешенной толщины льда численной модели HYCOM-CICE Датского метеорологического института (ДМИ) [20]. Численная модель HYCOM-CICE имеет разрешение 10x10 км и является совместной моделью морского льда – океана. Портал полярных данных ДМИ [22] используется также как источник данных по оценке объема льда СЛО, температуры поверхности океана/морского льда, аномалий температуры воздуха и поля приземного ветра.

Для иллюстрации ледовых условий Северной Полярной области и Южного океана за последние сутки используются ежедневные циркумполярные ледовые информационные продукты НЛЦ США по оценке расположения кромки льда и ледяных массивов - MIZ (Marginal Ice Zone).

Для цветовой окраски карт использован стандарт ВМО (WMO/Td. 1215) [19] для зимнего (по возрасту) и летнего (по общей сплошности) периодов. Следует также отметить, что в зонах стыковки карт ААНИИ, КЛС и НЛЦ наблюдается определенная несогласованность границ и характеристик ледовых зон вследствие ряда различий в ледовых информационных системах подготавливающих служб. Однако, данная несогласованность несущественна для целей интерпретации ледовых условий в рамках настоящего обзора.

Для получения оценок ледовитости (extent) и приведенной ледовитости – площади льда (area) отдельных секторов, морей, частей морей Северной полярной области и Южного океана и климатического положения кромок заданной повторяемости на основе данных спутниковых систем пассивного микроволнового зондирования SSMR-SSM/I-SSMIS [17] в МЦД МЛ ААНИИ принята следующая технология расчетов:

- источник данных – архивные (Cavalieri et al., 2008, Meier et al., 2006) и квазиоперативные (Maslanik and Stroeve, 1999) с задержкой 1-2 дня ежедневные матрицы (поля распределения) оценок общей сплошности Северной (севернее 45° с.ш.) и Южной (южнее 50° с.ш.) Полярных областей на основе обработанных по алгоритму NASATEAM данных многоканальных микроволновых радиометров SSMR-SSM/I-SSMIS ИСЗ

NIMBUS-7 и DMSP за период с 26.10.1978 г. по настоящий момент времени [13, 14, 15], копируемые с сервера НЦДСЛ;

- область расчета – Северная и Южная Полярные области и их регионы с использованием масок океан/суша НЦДСЛ ([http://nsidc.org/data/polar\\_stereo/tools\\_masks.html](http://nsidc.org/data/polar_stereo/tools_masks.html));
- границы используемых масок расчета отдельных меридиональных секторов, морей, частей морей Северной полярной области и Южного океана представлены на рисунках П1 – П6, не совпадают с используемыми в НЦДСЛ масками для отдельных акваторий Мирового океана и основаны на номенклатуре ААНИИ для морей Евразийского шельфа (Гренландское - Чукотское), Атласе Северного ледовитого океана (1980) и Атласе океанов (1980) издательства ГУНИО МО [1, 2, 3].
- вычислительные особенности расчета – авторское программное обеспечение ААНИИ с сохранением точности расчетов и оценке статистических параметров по гистограмме распределения и свободно-распространяемое программное обеспечение GDAL для векторизации полей климатических параметров;

В графическом формате PNG совмещенные карты ААНИИ-КЛС-НЛЦ доступны по адресу <http://wdc.aari.ru/datasets/d0040>.

Результаты расчетов ледовитости Северной, Южной полярных областей, их отдельных меридиональных секторов, морей и частей морей доступны на сервере МЦД МЛ ААНИИ в каталогах соответственно <http://wdc.aari.ru/datasets/ssmi/data/north/extents/> и <http://wdc.aari.ru/datasets/ssmi/data/south/extents/>.




Рисунок П1 – Секторальное деление северной полярной области. 1 - Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря); 2 - Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика); 3 - Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское, Японское)




Рисунок П2 – Северный ледовитый океан в официальных границах




Рисунок П3 – Моря северной полярной области. 1 – Арктический бассейн; 2- Баренцево море; 3 – Карское море; 4 – море Лаптевых; 5 - Восточно-Сибирское море; 6 – Чукотское море; 7 – море Бофорта; 8 – Канадский архипелаг; 9 – море Линкольна; 10 – Гренландское море; 11 – Норвежское море; 12 – Балтийское море; 13 – Белое море; 14 – Берингово море; 15 – Охотское море; 16 – Японское море; 17 – море Баффина; 18 – Дейвисов пролив; 19 – море Лабрадор; 20 – залив Святого Лаврентия; 21 – Гудзонов залив.




Рисунок П4 – Сектора и моря северной полярной области. 1 - Белое море; 2- Балтийское море; 3 – Баренцево море (СВ); 4 – Баренцево море (З); 5 - Баренцево море (ЮВ); 6 – Карское море (СВ); 7 – Карское море (ЮЗ); 8 – море Лаптевых (В); 9 – море Лаптевых (З); 10 – Восточно-Сибирское море (З); 11 – Восточно-Сибирское море (В); 12 –Чукотское море; 13 – Берингово море; 14 – Охотское море; 15 –Гренландское море; 16 – Норвежское море; 17 – Канадский архипелаг; 18 – Гудзонов залив; 19 – Дейвисов пролив; 20 - море Баффина; 21 – море Лабрадор; 22 - залив Святого Лаврентия; 23 - море Линкольна; 24 - море Бофорта; 25 - Японское море; 26 - сектор АО ( $30^{\circ}$ з.д. –  $10^{\circ}$ в.д.); 27 – сектор АО ( $10^{\circ}$ в.д. –  $30^{\circ}$ в.д.); 28 - сектор АО ( $30^{\circ}$ в.д. –  $65^{\circ}$ в.д.); 29 - сектор АО ( $65^{\circ}$ в.д. –  $96^{\circ}$ в.д.); 30 - сектор АО ( $96^{\circ}$ в.д. –  $140^{\circ}$ в.д.); 31 - сектор АО ( $140^{\circ}$ в.д. –  $180^{\circ}$ в.д.); 32 - сектор АО ( $180^{\circ}$ в.д. –  $156^{\circ}$ з.д.); 33 - сектор АО ( $156^{\circ}$ з.д. –  $123^{\circ}$ з.д.); 34 - сектор АО ( $123^{\circ}$ з.д. –  $30^{\circ}$ з.д.).




Рисунок П5 – Секторальное деление Южного океана. 1 - Атлантический сектор ( $60^{\circ}\text{W}$ - $30^{\circ}\text{E}$ , море Уэдделла); 2 - Индоокеанский сектор ( $30^{\circ}\text{E}$ - $150^{\circ}\text{E}$ , моря Космонавтов, Содружества, Моусона); 3 - Тихоокеанский сектор ( $150^{\circ}\text{E}$ - $60^{\circ}\text{W}$ , моря Росса, Беллинсгаузена)




Рисунок П6 – Моря Южного океана. 1 – Западная часть моря Уэдделла; 2- Восточная часть моря Уэдделла; 3 – Море Космонавтов; 4 – море Содружества; 5 – море Моусона; 6 – море Росса; 7 – Море Беллинсгаузена.

## Список источников

1. Атлас океанов. Северный Ледовитый океан. – 1980. М: Изд. ГУНИО МО СССР ВМФ – 184 с.
2. Атлас океанов. Термины. Понятия. Справочные таблицы. - Изд. ВМФ МО СССР.-1980.
3. Границы океанов и морей. – 1960. Л.: Изд. ГУНИО ВМФ. – 51 с.
4. Обзорные ледовые карты ФГБУ «ААНИИ» Северного Ледовитого океана за 2008-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0015>.
5. Комплексные ледовые карты ФГБУ «ААНИИ» Южного океана за 2014-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0015>.
6. Комплексные ледовые карты ФГБУ «ААНИИ» арктических и замерзающих морей России за 1997-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0004>.
7. Карты ФГБУ «ААНИИ» анализа крупных айсбергов Южного океана за 2014-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0015>.
8. Комплексные ледовые карты ФГБУ «Гидрометцентр России» Азовского, Каспийского и Белого морей за 2000-2017 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0033>.
9. Комплексные ледовые карты ФГБУ «НИЦ Планета» Азовского, Каспийского, Берингова, Охотского и Японского морей за 2016-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0034>.
10. Комплексные ледовые карты Северной полярной области и Южного океана Национального ледового центра США за 2003-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0032>.
11. Карты анализа крупных айсбергов Южного океана Национального ледового центра США за 2014-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0032>.
12. Комплексные ледовые карты Канадской Арктики Канадской ледовой службы за 2006-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0031>.
13. Cavalieri, D., C. Parkinson, P. Gloersen, and H. J. Zwally. 1996, updated 2008. *Sea Ice Concentrations from Nimbus-7 SMMR and DMSP SSM/I Passive Microwave Data*, [1978.10.26 – 2007.12.31]. Boulder, Colorado USA: National Snow and Ice Data Center. Digital media.
14. Meier, W., F. Fetterer, K. Knowles, M. Savoie, M. J. Brodzik. 2006, updated quarterly. *Sea Ice Concentrations from Nimbus-7 SMMR and DMSP SSM/I Passive Microwave Data*, [2008.01.01 – 2008.03.25]. Boulder, Colorado USA: National Snow and Ice Data Center. Digital media.
15. Maslanik, J., and J. Stroeve. 1999, updated daily. *Near-Real-Time DMSP SSM/I-SSMIS Daily Polar Gridded Sea Ice Concentrations*, [2008.03.26 – present moment]. Boulder, Colorado USA: National Snow and Ice Data Center. Digital media.
16. Andersen, S., R. Tonboe, L. Kaleschke, G. Heygster, and L. T. Pedersen, Intercomparison of passive microwave sea ice concentration retrievals over the high-concentration Arctic sea ice.// *J. Geophys. Res.* – 2007. – Vol. 112. C08004, doi:10.1029/2006JC003543.
17. Статистические характеристики сплошности морского льда Северной полярной области и Южного океана на основе данных наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/ssmi>.

18. SIGRID-3: A vector archive format for Sea Ice Georeferenced Information and Data - JCOMM Technical Report Series No. 23, 2014, WMO/TD-No.1214.
19. Ice Chart Colour Code Standard. - JCOMM Technical Report Series No. 24, 2004, WMO/TD-No.1215.  
[\(http://jcomm.info/index.php?option=com\\_oe&task=viewDocumentRecord&docID=4914\)](http://jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=4914)
20. Danish Meteorological Institute North Atlantic - Arctic Ocean model HYCOM-CICE - <http://ocean.dmi.dk/models/hycom.uk.php>
21. Портал данных ледового анализа Южного океана Норвежского метеорологического института - <http://polarview.met.no/Antarctic.html>
22. Портал полярных данных Датского метеорологического института - <http://polarportal.dk>