

ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт»
Мировой центр данных по морскому льду



Информационные материалы по мониторингу морского ледяного покрова
Арктики и Южного Океана на основе данных ледового картирования и
пассивного микроволнового зондирования SSMR-SSM/I-SSMIS-AMSR₂

18.08.2025 – 26.08.2025

№ 35(725)

Санкт-Петербург 2025

тел. +7(812)337-3149, эл.почта: vms@aari.aq
Адрес в сети Интернет: <http://wdc.aari.ru/datasets/doo42/>

Содержание

Северное Полушарие	3
Рисунок 1а – Обзорная ледовая карта СЛО (цветовая раскраска по общей сплоченности)	3
Рисунок 1б – Обзорная ледовая карта СЛО (цветовая раскраска по преобладающему возрасту).	4
Рисунок 1в - Оценка толщины льда на основе данных ИСЗ AMSR2.....	5
Рисунок 1г – Положение кромки льда и зон разреженных и сплоченных льдов СЛО.....	6
Рисунок 1д – Обзорная ледовая карта СМП.....	7
Рисунок 2а – Ледовые условия за 24.01 - 28.01.2025. и аналогичные периоды 2007-2024 гг.....	8
Рисунок 2б – Поля распределения средневзвешенной толщины льда совместной модели морского льда	10
Рисунок 2в – Аномалия температуры поверхности морского льда и океана (к периоду 1991-2020 гг.)	11
Рисунок 2г – Поле дрейфа морского льда Арктики за последнюю неделю	12
Рисунок 2д – Ежедневные оценки сезонного хода объема морского льда СЛО.....	13
Рисунок 2е – Аномалии приземной температуры воздуха (2м) и осредненные вектора скорости ветра	14
Рисунок 2ж – Аномалии приземной суммы осадков за последнюю пентаду 2022-2025 гг.	15
Таблица 1 - Медианные значения ледовитости для Северной полярной области	16
Таблица 2 – Экстремальные и средние значения ледовитости для Северной полярной области	17
Таблица 3 – Динамика изменения значений ледовитости для морей Северной полярной области.....	17
Рисунок 3а – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости для Северной Полярной Области	19
Рисунок 3б – Ежедневные оценки сезонных изменений ледовитости для Северной Полярной Области.....	20
Южный океан	21
Рисунок 5а – Ледовая карта Южного океана (цветовая окраска по общей сплоченности)	21
Рисунок 5б – Ледовая карта Южного океана (цветовая окраска по возрасту)	22
Рисунок 5в – Положение кромки льда и зон разреженных и сплоченных льдов Южного океана.....	23
Таблица 4 – Линейные размеры крупных айсбергов Южного океана	26
Рисунок 7а – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости Южного Океана	27
Рисунок 7б – Ежедневные оценки сезонных изменений ледовитости для Южного океана	28
Таблица 5 - Медианные значения ледовитости для Южного океана	29
Таблица 6 – Экстремальные значения ледовитости для Южного океана и 3 меридиональных секторов.....	29
Таблица 7 – Динамика изменения значений ледовитости для морей Южного океана.....	29
Рисунок 9 – Ежедневные сглаженные значения ледовитости (площади распространения морского льда) Арктики, Антарктики и Земли в целом.....	30
Рисунок 10 – Ежедневные сглаженные значения приведенной ледовитости (площади морского льда) Арктики, Антарктики и Земли в целом.....	31
Рисунок 11 – Ежедневные сглаженные значения средней общей сплоченности Арктики и Антарктики.....	32
Приложение 1 – Статистические значения ледовитостей по отдельным акваториям Северной Полярной Области и Южного океана	33
Таблица 8 – Средние, аномалии среднего и экстремальные значения ледовитостей для Северной и Южной полярных областей и её отдельных акваторий.....	33
Таблица 10 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Северной полярной области и Южного океана	37
Характеристика исходного материала и методика расчетов	38
Список источников	43




Рисунок 1а – Обзорная ледовая карта СЛО за 21.08.2025 – 26.08.2025 (цветовая раскраска по общей сплоченности) на основе ледового анализа NOAA Аляска, ААНИИ и Национального ледового центра США и повторяемость кромки за соответствующий 5-дневный период за 1991-2020 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM) [4, 10, 23, 17].






Рисунок 16 – Обзорная ледовая карта СЛО за 21.08.2025 – 26.08.2025 (цветовая раскраска по преобладающему возрасту) на основе ледового анализа NOAA Аляска, ААНИИ и Национального ледового центра США и повторяемость кромки за соответствующий 5-дневный период за 1991-2020 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM) [4, 10, 23, 17].



2025.08.18

Рисунок 1в - Оценка толщины льда и степени разрушенности на основе данных пассивного микроволнового зондирования AMSR2 за текущий и предыдущий сроки [29].



2025.08.25







Рисунок 1г – Мозаика снимков Sentinel-1 (DTU) за 19.08.2025 – 25.08.2025, положение крупных полыней по данным AMSR2 за 26.08.2025 (AWI v110), повторяемость кромки за соответствующий 5-дневный период за 1991-2020 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM) и положение РСН СП-42 на 27.08.2025 г. 08:00МСК.







2007




2012




2014




2016




2020




2022



2023




2024




2025


Рисунок 1ж – Ледовые условия за 21.08 - 26.08.2025. и аналогичные периоды 2007-2024 гг. на основе ледового анализа ААНИИ, НИЦ Планета, Канадской ледовой службы, Национального ледового центра США и НОАА Аляска [4, 10, 12, 23, 17].




2025



2022




2020




2018


Рисунок 2а – Оценка возраста льда (сутки) на 22.08 за 2018 – 2025 гг. по данным JAXA-NIPR [29]




2025




2024




2023




2022




2020




2016




2014




2013




2012



2007



2006



2005

Рисунок 26 – Поля распределения средневзвешенной толщины льда совместной модели морского льда – океана HYCOM/CICE Датского метеорологического института 26.08 за 2005-2025 гг. [22].




Рисунок 2в – Аномалия температуры поверхности морского льда и океана (к периоду 1991-2020 гг.) Датского метеорологического института за последний доступный срок [22]




Рисунок 2г – Поле дрейфа морского льда Северной полярной области за последний доступный срок по данным AMSR2, источник JAXA [29].




Рисунок 2д – Ежедневные оценки сезонного хода объема морского льда СЛО на основе расчетов средневзвешенной толщины льда совместной модели морского льда – океана HYCOM/CICE Датского метеорологического института с 28.02.2004 по последний доступный срок [22].




Рисунок 2е – Аномалии приземной температуры воздуха (2м) и осредненные вектора скорости ветра (10 м) за последнюю пентаду 2022-2025 гг. относительно периода 2004-2013 гг. (<http://polarportal.dk>) [22]




Рисунок 2ж – Аномалии приземной суммы осадков за последнюю пентаду 2022-2025 гг. относительно периода 2004-2013 гг [22].

Таблица 1 - Медианные значения ледовитости для Северной полярной области, 3-х меридиональных секторов и морей СМП за текущие 30 и 7-дневные интервалы, и её аномалии от 2020-2024 гг. и интервалов 2015-2025 гг. и 1978-2025 гг. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритмы NASATEAM [13-17]

Северная полярная область

Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2015-2025гг	1978-2025гг
25.07-24.08	6041.9	349.7	-204.8	-514.4	-184.2	176.9	18.9	-1135.7
		6.1	-3.3	-7.8	-3.0	3.0	0.3	-15.8
18-24.08	5392.8	504.1	-283.6	-460.0	92.8	336.0	133.1	-1046.6
		10.3	-5.0	-7.9	1.8	6.6	2.5	-16.3

Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря)

Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2015-2025гг	1978-2025гг
25.07-24.08	1020.5	-189.7	-250.4	-277.9	-546.3	-101.6	-246.1	-637.9
		-15.7	-19.7	-21.4	-34.9	-9.1	-19.4	-38.5
18-24.08	922.7	-110.3	-219.2	-321.9	-510.3	-24.2	-227.1	-570.5
		-10.7	-19.2	-25.9	-35.6	-2.6	-19.7	-38.2

Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское)

Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2015-2025гг	1978-2025гг
25.07-24.08	1986.1	558.9	276.0	-178.0	34.7	-164.3	76.0	-378.6
		39.2	16.1	-8.2	1.8	-7.6	4.0	-16.0
18-24.08	1864.3	668.4	419.1	-60.4	295.8	-72.3	227.0	-249.2
		55.9	29.0	-3.1	18.9	-3.7	13.9	-11.8

Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика)

Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2015-2025гг	1978-2025гг
25.07-24.08	3035.3	-19.6	-230.5	-58.5	327.4	442.8	189.0	-119.3
		-0.6	-7.1	-1.9	12.1	17.1	6.6	-3.8
18-24.08	2605.9	-54.0	-483.4	-77.7	307.3	432.5	133.2	-226.9
		-2.0	-15.6	-2.9	13.4	19.9	5.4	-8.0

Северный Ледовитый океан

Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2015-2025гг	1978-2025гг
25.07-24.08	5750.1	343.4	-220.7	-484.3	-186.9	181.9	-44.4	-1272.3
		6.4	-3.7	-7.8	-3.1	3.3	-0.8	-18.1
18-24.08	5122.6	498.6	-292.4	-465.1	92.8	368.5	64.1	-1202.7
		10.8	-5.4	-8.3	1.8	7.8	1.3	-19.0

Моря СМП (моря Карское-Чукотское)


Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2015-2025гг	1978-2025гг
25.07-24.08	653.3	445.2	17.4	-219.9	-182.8	-131.2	-5.2	-639.4
		213.9	2.7	-25.2	-21.9	-16.7	-0.8	-49.5
18-24.08	504.7	468.0	83.1	-136.4	-7.4	-33.5	82.5	-486.2
		1274.7	19.7	-21.3	-1.4	-6.2	19.5	-49.1

Таблица 2 – Экстремальные и средние значения ледовитости для Северной полярной области, 3 меридиональных секторов и моря СМП за текущий 7-дневный интервал по данным наблюдений [13-17]


Северная полярная область				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
18-24.08	4208.5 24.08.2012	8202.4 18.08.1996	6439.4	6525.2
Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря)				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
18-24.08	901.6 21.08.2018	2183.2 19.08.1981	1493.2	1449.6
Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское)				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
18-24.08	1023.9 24.08.2007	3001.6 18.08.1996	2113.4	2071.0
Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика)				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
18-24.08	1771.4 24.08.2012	3618.1 19.08.1983	2832.8	2933.0
Северный Ледовитый океан				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
18-24.08	4140.3 24.08.2012	8060.1 18.08.1996	6325.3	6464.1
Моря СМП (моря Карское-Чукотское)				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
18-24.08	28.4 24.08.2020	2064.2 18.08.1996	990.9	848.7

Таблица 3 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Северной полярной области за 18.08 – 24.08.2025 г. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SMIS [13-17]


Регион	Северная полярная область	Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря)	Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское)	Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика)	Северный Ледовитый океан	Моря СМП (моря Карское-Чукотское)
Разность	-289.2	-1.4	-46.9	-240.8	-287.3	-59.6
тыс. кв. км/сут.	-41.3	-0.2	-6.7	-34.4	-41.0	-8.5




а)




б)




в)



г)



д)



е)

Рисунок 3а – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости для Северной Полярной Области и трех меридиональных секторов, СЛО и морей СМП за период 26.10.1978 – последний доступный срок по годам на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритмы NASATEAM: а) Северная полярная область, б) сектор 45°W-95°E (Гренландское – Карское моря), в) сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых – Чукотское и Берингово, Охотское), г) сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика), д) Северный Ледовитый океан, е) Северный морской путь (Карское - Чукотское моря) [13-17].




Рисунок 36 – Ежедневные оценки сезонных изменений ледовитости для Северной Полярной Области за период 26.10.1978 – последний доступный срок на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM [13-17].

Южный океан




Рисунок 5а – Ледовая карта Южного океана (цветовая окраска по общей сплоченности) и расположение крупных айсбергов на основе ледового анализа за 21.08.2025 в рамках проекта совместного ледового картирования Южного океана ААНИИ, НЛЦ США и НМИ и повторяемость кромки за ближайшую пентаду за период 1991-2020 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM) [5, 10, 17, 21]




Рисунок 56 – Ледовая карта Южного океана (цветовая окраска по возрасту) и расположение крупных айсбергов на основе ледового анализа за 21.08.2025 в рамках проекта совместного ледового картирования Южного океана ААНИИ, НЛЦ США и НМИ и повторяемость кромки за ближайшую пентаду за период 1991-2020 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM) [5, 10, 17, 21].




Рисунок 5в – Положение кромки льда и зон разреженных ($<8/10$) и сплошных ($\geq 8/10$) льдов Южного океана за 26.08.2025 г. и расположение крупных айсбергов за 21.08.2025 на основе ледового анализа Национального Ледового Центра США, повторяемость кромки за ближайшую пентаду за период 1991-2020 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM), совмещенное с положением разрежений на основе данных ИСЗ AMSR2 за 26.08.2025 (AWI, v110) [10, 17, 24]




Рисунок 5г – Оценка возраста льда (сутки) Южного океана за последний доступный срок по данным JAXA-NIPR [29]






Рисунок 6 – Поле дрейфа морского льда Южного океана за последний доступный срок по данным AMSR2, источник JAXA [29]

Таблица 4 – Линейные размеры и площадь крупных айсбергов Южного океана на основе анализа НЛЦ США за 18.07.2025 [11]



Имя	Длина км	Ширина км	Площадь кв.км	Имя	Длина км	Ширина км	Площадь кв.км
D15A	94.5	40.7	3071.0	D34	20.4	14.8	171.8
A23A	74.1	59.3	2509.5	B09G	22.2	13.0	160.9
B22A	53.7	46.3	1829.7	A23D	24.1	11.1	159.5
A81	51.9	46.3	1420.3	D23	13.0	11.1	123.3
A74A	55.6	33.3	987.7	D32	16.7	11.1	104.7
C36	42.6	29.6	866.3	B22I	16.7	9.3	100.8
D15B	59.3	22.2	833.4	C39	27.8	14.8	97.6
D33A	63.0	18.5	642.3	B15AB	18.5	7.4	92.5
B09B	50.0	18.5	505.5	B22G	16.7	9.3	84.6
D37	55.6	13.0	477.8	C30	16.7	5.6	76.3
D35	51.9	11.1	346.2	A23E	16.7	7.4	73.0
A76C	29.6	13.0	338.8	C31	16.7	5.6	72.1
B22F	25.9	14.8	335.9	C33	20.4	7.4	64.1
A77	50.0	7.4	322.6	A85	18.5	5.6	62.6
D33B	38.9	22.2	304.6	C24	20.4	5.6	62.3
C21B	22.2	14.8	258.1	A80A	16.7	13.0	60.2
B22H	35.2	13.0	238.8	C35	14.8	9.3	57.3
D33C	27.8	13.0	222.3	B29	20.4	9.3	56.9
C15	25.9	18.5	213.0	D36A	11.1	9.3	44.5
A84	22.2	11.1	206.0	C38B	14.8	13.0	38.9
C18B	37.0	7.4	195.8	D36B	16.7	3.7	27.2
A83	22.2	13.0	189.8				

Суммарная площадь == **18106 кв. км** (05.06.2025 – 18240, 02.05.2025 – 18445, 27.03.2025 – 18830, 21.02.2025 – 19222, 23.01.2025 – 18636 кв. км)



а)

б)



в)

г)

Рисунок 7а – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости Южного Океана и меридиональных секторов за период 26.10.1978 – последний доступный срок по годам на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM: а) Южный Океан, б) Атлантический сектор (60°W-30°E, море Уэдделла), в) Индоокеанский сектор (30°E-150°E, моря Космонавтов, Содружества, Моусона), г) Тихоокеанский сектор (150°E-60°W, моря Росса, Беллинсгаузена) [13-17]




Рисунок 76 – Ежедневные оценки сезонных изменений ледовитости для Южного океана за период 26.10.1978 – последний доступный срок на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM [13-17].

Таблица 5 - Медианные и экстремальные значения ледовитости для Южного океана и 3 меридиональных секторов за текущие 30 и 7-дневные интервалы и её аномалии от 2020-2024 гг. и интервалов 2015-2025 гг. и 1978-2025 гг. по данным наблюдений SSMR-SSM/I [13-17]

Южный Океан								
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2015-2025гг	1978-2025гг
25.07-24.08	16159.4	-1042.6	-1676.5	-402.5	1036.8	272.1	-625.5	-1168.0
		-6.1	-9.4	-2.4	6.9	1.7	-3.7	-6.7
18-24.08	16743.5	-1222.7	-1643.6	-464.3	916.8	86.4	-643.1	-1131.3
		-6.8	-8.9	-2.7	5.8	0.5	-3.7	-6.3
Атлантический сектор (60°W-30°E, море Уэдделла)								
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2015-2025гг	1978-2025гг
25.07-24.08	6576.3	-627.0	-486.2	274.3	659.3	313.4	-112.7	-289.9
		-8.7	-6.9	4.4	11.1	5.0	-1.7	-4.2
18-24.08	6756.3	-743.4	-534.2	85.7	655.7	-10.9	-192.5	-309.7
		-9.9	-7.3	1.3	10.7	-0.2	-2.8	-4.4
Индоокеанский сектор (30°E-150°E, моря Космонавтов, Содружества, Моусона)								
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2015-2025гг	1978-2025гг
25.07-24.08	3473.7	-316.2	-723.2	-228.2	-33.3	142.4	-269.5	-511.9
		-8.3	-17.2	-6.2	-0.9	4.3	-7.2	-12.8
18-24.08	3640.8	-230.4	-707.8	-319.5	-213.1	110.0	-295.2	-572.0
		-6.0	-16.3	-8.1	-5.5	3.1	-7.5	-13.6
Тихоокеанский сектор (150°E-60°W, моря Росса, Беллинсгаузена)								
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2015-2025гг	1978-2025гг
25.07-24.08	6109.3	-99.4	-467.2	-448.6	410.8	-183.7	-243.4	-366.2
		-1.6	-7.1	-6.8	7.2	-2.9	-3.8	-5.7
18-24.08	6346.4	-248.9	-401.5	-230.4	474.3	-12.7	-155.4	-249.6
		-3.8	-6.0	-3.5	8.1	-0.2	-2.4	-3.8
Южный Океан								
Месяц	Минимальное знач.		Максимальное знач.		Среднее знач.		Медиана	
18-24.08	15673.0 18.08.2023		19171.9 22.08.2014		17874.8		17926.7	
Атлантический сектор (60°W-30°E, море Уэдделла)								
Месяц	Минимальное знач.		Максимальное знач.		Среднее знач.		Медиана	
18-24.08	6045.8 20.08.2023		8071.6 21.08.1980		7066.0		7138.4	
Индоокеанский сектор (30°E-150°E, моря Космонавтов, Содружества, Моусона)								
Месяц	Минимальное знач.		Максимальное знач.		Среднее знач.		Медиана	
18-24.08	3453.4 20.08.2024		5089.5 23.08.2014		4212.7		4174.1	
Тихоокеанский сектор (150°E-60°W, моря Росса, Беллинсгаузена)								
Месяц	Минимальное знач.		Максимальное знач.		Среднее знач.		Медиана	
18-24.08	5814.1 19.08.2023		7493.3 20.08.2013		6596.0		6599.8	

Таблица 6 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Южного океана за 18.08 – 24.08.2025 по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS [13-17]

Регион	Южный Океан	Атлантический сектор	Индоокеанский сектор	Тихоокеанский сектор
Разность	327.0	200.7	95.7	30.6
тыс.кв.км/сут.	46.7	28.7	13.7	4.4




Рисунок 9 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения ледовитости (площади распространения морского льда) Арктики, Антарктики и Земли в целом с 26.10.1978 по последний доступный срок на основе SSMR-SSM/I-SSMIS [13-17]




Рисунок 10 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения приведенной ледовитости (площади морского льда) Арктики, Антарктики и Земли в целом с 25.10.1978 по последний доступный срок на основе SSMR-SSM/I-SSMIS [13-17]




Рисунок 11 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения средней общей сплоченности Арктики и Антарктики с 07.11.1978 по последний доступный срок на основе SSMR-SSM/I-SSMIS [13-17]

Приложение 1 – Статистические значения ледовитостей по отдельным акваториям Северной Полярной Области и Южного океана

Таблица 8 – Средние, аномалии среднего и экстремальные значения ледовитостей для Северной и Южной полярных областей и её отдельных акваторий за текущие 7-дневный (неделя) и 30-дневный промежутки времени по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM за период 1978-2024 гг.

18-24.08

Регион	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%							1978-2025гг			
		2007 г	2012 г	2022 г	2023 г	2024 г	2015-2025гг	1978-2025гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Сев. полярная область	5392.8	411.5	976.2	-460.0	92.8	336.0	133.1	-1046.6	4208.5	8202.4	6439.4	6525.2
		8.3	22.1	-7.9	1.8	6.6	2.5	-16.3	24.08.2012	18.08.1996		
Сектор 45°W-95°E	922.7	-569.0	-376.2	-321.9	-510.3	-24.2	-227.1	-570.5	901.6	2183.2	1493.2	1449.6
		-38.1	-29.0	-25.9	-35.6	-2.6	-19.7	-38.2	21.08.2018	19.08.1981		
Гренландское море	142.8	-228.3	-193.9	-146.6	-117.7	48.4	-55.6	-142.3	77.2	565.5	285.1	281.5
		-61.5	-57.6	-50.7	-45.2	51.3	-28.0	-49.9	24.08.2002	19.08.1981		
Баренцево море	9.4	-26.1	3.0	-2.0	-21.4	5.0	-5.9	-52.7	0.7	240.7	62.1	41.8
		-73.6	47.5	-17.6	-69.6	113.4	-38.7	-84.9	20.08.2000	24.08.1982		
Карское море	13.1	-79.9	0.7	-34.0	-111.5	-1.9	-31.6	-179.5	4.4	518.4	192.7	156.2
		-85.9	5.5	-72.2	-89.5	-12.6	-70.7	-93.2	21.08.2018	18.08.1980		
Сектор 95°E-170°W	1864.3	793.2	587.7	-60.4	295.8	-72.3	227.0	-249.2	1023.9	3001.6	2113.4	2071.0
		74.1	46.0	-3.1	18.9	-3.7	13.9	-11.8	24.08.2007	18.08.1996		
Море Лаптевых	134.0	-98.0	68.6	-60.2	-144.8	-19.3	-9.0	-117.8	7.0	571.0	251.8	231.1
		-42.2	104.9	-31.0	-51.9	-12.6	-6.3	-46.8	18.08.2020	24.08.1996		
Восточно-Сибирское море	318.9	315.4	241.6	-29.7	231.8	122.1	140.9	-96.8	0.6	863.2	415.7	385.2
		8865.9	312.5	-8.5	266.1	62.0	79.2	-23.3	24.08.2007	19.08.1996		
Чукотское море	38.7	36.3	-50.6	-12.4	17.1	-134.3	-17.8	-92.1	0.0	384.6	130.8	115.5
		1531.3	-56.7	-24.2	79.0	-77.6	-31.5	-70.4	23.08.2009	20.08.1988		
Берингово море	7.2	7.2	7.2	2.2	1.8	1.6	2.6	6.1	0.0	12.5	1.1	0.0
		-	-	44.7	32.9	28.8	57.8	570.9	18.08.1979	24.08.2015		
Сектор 170°W-45°W	2605.9	187.4	764.8	-77.7	307.3	432.5	133.2	-226.9	1771.4	3618.1	2832.8	2933.0
		7.7	41.5	-2.9	13.4	19.9	5.4	-8.0	24.08.2012	19.08.1983		
Море Бофорта	246.0	73.6	221.9	-1.1	162.9	221.4	77.9	1.9	10.9	477.9	244.1	254.2
		42.7	924.2	-0.5	196.1	901.6	46.4	0.8	20.08.2024	24.08.1991		
Гудзонов залив	44.1	21.9	15.7	6.7	2.5	13.1	11.0	8.3	10.4	108.0	35.8	32.1
		98.8	55.1	18.0	5.9	42.3	33.4	23.0	22.08.2010	23.08.1980		
Море Лабрадор	1.6	-0.5	1.6	1.1	1.1	-0.4	-0.3	-1.7	0.0	22.5	3.3	2.3
		-21.9	-	200.0	235.3	-21.4	-17.7	-51.0	18.08.2011	18.08.1982		
Дейвисов пролив	28.4	4.4	12.5	0.6	-1.0	6.9	4.4	-2.2	7.8	160.5	30.6	24.0
		18.5	78.1	2.0	-3.4	32.3	18.1	-7.2	20.08.2002	18.08.1983		
Канадский архипелаг	450.1	118.1	99.5	83.7	123.8	163.0	18.2	-81.5	230.1	857.1	531.6	545.0
		35.6	28.4	22.9	38.0	56.8	4.2	-15.3	21.08.2024	20.08.1992		

25.07-24.08

Регион	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%							1978-2025гг			
		2007 г	2012 г	2022 г	2023 г	2024 г	2015- 2025гг	1978- 2025гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Сев. полярная область	6041.9	204.8	467.7	-514.4	-184.2	176.9	18.9	-1135.7	4208.5	9807.9	7177.6	7226.2
		3.5	8.4	-7.8	-3.0	3.0	0.3	-15.8	24.08.2012	25.07.1983		
Сектор 45°W- 95°E	1020.5	-565.4	-332.1	-277.9	-546.3	-101.6	-246.1	-637.9	900.3	2725.0	1658.4	1617.4
		-35.7	-24.6	-21.4	-34.9	-9.1	-19.4	-38.5	16.08.2025	25.07.1981		
Гренландское море	160.4	-225.6	-205.3	-129.5	-161.1	-6.9	-79.5	-172.0	77.2	620.0	332.5	327.0
		-58.4	-56.1	-44.7	-50.1	-4.1	-33.1	-51.7	24.08.2002	25.07.1992		
Баренцево море	8.2	-39.5	-2.4	-5.8	-36.0	0.6	-16.2	-81.0	0.6	409.1	89.2	68.4
		-82.8	-22.9	-41.4	-81.4	8.1	-66.4	-90.8	11.08.2024	25.07.1982		
Карское море	19.3	-178.2	-6.6	-49.1	-163.4	-11.6	-54.8	-249.3	4.4	801.0	268.6	225.5
		-90.2	-25.6	-71.8	-89.4	-37.6	-73.9	-92.8	21.08.2018	27.07.1999		
Сектор 95°E- 170°W	1986.1	530.8	138.4	-178.0	34.7	-164.3	76.0	-378.6	1023.9	3254.9	2364.7	2383.9
		36.5	7.5	-8.2	1.8	-7.6	4.0	-16.0	24.08.2007	25.07.1979		
Море Лаптевых	184.1	-61.9	69.2	-28.6	-91.8	36.8	0.6	-128.3	7.0	667.9	312.4	288.5
		-25.2	60.3	-13.5	-33.3	25.0	0.3	-41.1	17.08.2021	25.07.1979		
Восточно- Сибирское море	371.6	303.9	46.6	-120.6	61.4	5.1	65.2	-158.5	0.6	915.1	530.1	521.7
		449.0	14.3	-24.5	19.8	1.4	21.3	-29.9	24.08.2007	25.07.1996		
Чукотское море	78.3	65.2	-133.4	-21.6	11.0	-161.5	-16.3	-103.2	0.0	461.4	181.6	184.2
		499.3	-63.0	-21.6	16.3	-67.3	-17.2	-56.9	23.08.2009	25.07.1983		
Берингово море	9.3	8.2	8.2	1.1	-0.3	1.1	2.0	6.6	0.0	32.9	2.7	0.0
		770.3	786.4	12.8	-2.6	12.8	27.9	244.4	25.07.2010	29.07.2023		
Сектор 170°W- 45°W	3035.3	239.3	661.3	-58.5	327.4	442.8	189.0	-119.3	1771.4	4505.2	3154.5	3183.1
		8.6	27.9	-1.9	12.1	17.1	6.6	-3.8	24.08.2012	25.07.1992		
Море Бофорта	329.5	109.3	261.2	42.8	209.7	252.7	114.0	51.2	10.9	485.9	278.3	293.2
		49.6	382.7	14.9	175.1	329.1	52.9	18.4	20.08.2024	26.07.2000		
Гудзонов залив	41.5	18.1	10.9	-0.7	1.5	-2.4	4.7	-6.2	4.8	444.6	47.7	37.0
		77.7	35.6	-1.7	3.7	-5.5	12.9	-12.9	10.08.1995	25.07.1992		
Море Лабрадор	2.4	-0.7	0.8	0.1	0.4	-2.5	-1.8	-2.1	0.0	50.1	4.5	3.3
		-22.8	45.7	6.1	19.1	-51.2	-42.3	-47.1	27.07.1997	27.07.1991		
Дейвисов пролив	45.2	14.4	17.2	-24.6	-0.9	14.4	-2.4	-16.2	6.1	264.8	61.4	37.9
		46.7	61.3	-35.3	-1.9	46.5	-5.0	-26.4	09.08.2010	30.07.1983		
Канадский архипелаг	530.3	-19.8	48.9	-12.2	40.2	116.3	-23.6	-129.1	230.1	1058.6	659.4	674.0
		-3.6	10.2	-2.3	8.2	28.1	-4.3	-19.6	21.08.2024	25.07.1983		

18-24.08

Регион	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%							1978-2025гг			
		2007 г	2012 г	2022 г	2023 г	2024 г	2015- 2025гг	1978- 2025гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Южный Океан	16743.5	-905.7	-1401.3	-464.3	916.8	86.4	-643.1	-1131.3	15673.0	19171.9	17874.8	17926.7
		-5.1	-7.7	-2.7	5.8	0.5	-3.7	-6.3	18.08.2023	22.08.2014		
Атлантический сектор	6756.3	-534.8	-343.7	85.7	655.7	-10.9	-192.5	-309.7	6045.8	8071.6	7066.0	7138.4
		-7.3	-4.8	1.3	10.7	-0.2	-2.8	-4.4	20.08.2023	21.08.1980		
Западная часть моря Уэдделла	2403.0	-91.0	97.8	66.6	94.0	-515.0	-74.0	-80.4	2145.8	3218.9	2483.5	2443.8
		-3.6	4.2	2.9	4.1	-17.6	-3.0	-3.2	19.08.1983	18.08.1980		
Восточная часть моря Уэдделла	4353.2	-443.9	-441.5	19.1	561.6	504.1	-118.4	-229.3	3673.1	5433.5	4582.5	4612.8
		-9.3	-9.2	0.4	14.8	13.1	-2.6	-5.0	18.08.1986	23.08.1992		
Индоокеанский сектор	3640.8	-171.2	-839.5	-319.5	-213.1	110.0	-295.2	-572.0	3453.4	5089.5	4212.7	4174.1
		-4.5	-18.7	-8.1	-5.5	3.1	-7.5	-13.6	20.08.2024	23.08.2014		
Море Космонавтов	726.5	-180.4	-410.4	-308.7	-202.0	-25.9	-264.8	-349.5	705.4	1434.2	1076.0	1081.6
		-19.9	-36.1	-29.8	-21.8	-3.4	-26.7	-32.5	23.08.2025	24.08.2014		
Море Содружества	1436.7	7.9	-31.3	213.6	169.4	104.2	132.3	4.7	1032.3	1783.0	1431.9	1422.5
		0.6	-2.1	17.5	13.4	7.8	10.1	0.3	20.08.2017	24.08.2006		
Море Моусона	1477.6	1.2	-397.9	-224.4	-180.5	31.7	-162.8	-227.3	1340.0	2295.3	1704.9	1677.7
		0.1	-21.2	-13.2	-10.9	2.2	-9.9	-13.3	18.08.2002	24.08.1982		
Тихоокеанский сектор	6346.4	-199.7	-218.1	-230.4	474.3	-12.7	-155.4	-249.6	5814.1	7493.3	6596.0	6599.8
		-3.1	-3.3	-3.5	8.1	-0.2	-2.4	-3.8	19.08.2023	20.08.2013		
Море Росса	5705.5	176.8	266.8	-352.9	1096.3	431.5	309.1	269.4	4474.0	6119.6	5436.1	5458.5
		3.2	4.9	-5.8	23.8	8.2	5.7	5.0	18.08.1980	24.08.2010		
Море Беллингаузена	640.9	-376.5	-484.9	122.5	-622.0	-444.1	-464.5	-518.9	433.4	1612.5	1159.9	1153.2
		-37.0	-43.1	23.6	-49.3	-40.9	-42.0	-44.7	22.08.2022	23.08.2015		

25.07-24.08

Регион	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%							1978-2025гг			
		2007 г	2012 г	2022 г	2023 г	2024 г	2015-2025гг	1978-2025гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Южный Океан	16159.4	-1278.4	-1553.5	-402.5	1036.8	272.1	-625.5	-1168.0	14328.7	19171.9	17327.4	17407.3
		-7.3	-8.8	-2.4	6.9	1.7	-3.7	-6.7	25.07.2023	22.08.2014		
Атлантический сектор	6576.3	-589.6	-264.0	274.3	659.3	313.4	-112.7	-289.9	5593.4	8079.9	6866.2	6896.8
		-8.2	-3.9	4.4	11.1	5.0	-1.7	-4.2	28.07.2024	08.08.1992		
Западная часть моря Уэдделла	2345.5	-239.0	8.8	37.7	14.0	-457.7	-83.7	-124.9	2067.9	3226.4	2470.4	2425.0
		-9.2	0.4	1.6	0.6	-16.3	-3.4	-5.1	13.08.1983	17.08.1980		
Восточная часть моря Уэдделла	4230.8	-350.5	-272.8	236.6	645.3	771.0	-29.0	-165.0	3012.1	5433.5	4395.9	4450.2
		-7.7	-6.1	5.9	18.0	22.3	-0.7	-3.8	28.07.2024	23.08.1992		
Индоокеанский сектор	3473.7	-122.4	-860.4	-228.2	-33.3	142.4	-269.5	-511.9	2976.6	5089.5	3985.7	3989.3
		-3.4	-19.9	-6.2	-0.9	4.3	-7.2	-12.8	25.07.2024	23.08.2014		
Море Космонавтов	688.3	-143.1	-426.6	-314.6	-114.6	47.3	-219.1	-302.4	440.3	1455.1	990.7	998.2
		-17.2	-38.3	-31.4	-14.3	7.4	-24.1	-30.5	26.07.2024	14.08.2010		
Море Содружества	1341.9	-24.9	-52.7	116.2	217.0	78.5	90.3	-22.9	923.7	1783.5	1364.8	1365.9
		-1.8	-3.8	9.5	19.3	6.2	7.2	-1.7	25.07.2016	09.08.2006		
Море Моусона	1443.5	45.6	-381.0	-29.7	-135.7	16.6	-140.6	-186.7	1155.6	2295.3	1630.2	1625.2
		3.3	-20.9	-2.0	-8.6	1.2	-8.9	-11.5	27.07.2018	24.08.1982		
Тихоокеанский сектор	6109.3	-566.4	-429.1	-448.6	410.8	-183.7	-243.4	-366.2	5485.9	7493.3	6475.5	6484.6
		-8.5	-6.6	-6.8	7.2	-2.9	-3.8	-5.7	30.07.1980	20.08.2013		
Море Росса	5422.6	-196.5	3.8	-450.5	857.8	349.6	123.7	58.7	3986.2	6119.6	5363.9	5393.3
		-3.5	0.1	-7.7	18.8	6.9	2.3	1.1	01.08.1980	24.08.2010		
Море Беллингаузена	686.7	-369.9	-432.9	1.9	-447.1	-533.3	-367.1	-424.9	433.4	1662.0	1111.6	1116.8
		-35.0	-38.7	0.3	-39.4	-43.7	-34.8	-38.2	22.08.2022	03.08.1995		

Таблица 10 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Северной полярной области и Южного океана за текущий 7-дневный (неделя) промежуток времени по данным наблюдений SSMIS

18-24.08

Регион	Сев. полярная область	Сектор 45°W-95°E	Гренландское море	Баренцево море
Разность	-289.2	-1.4	19.5	2.7
тыс.кв.км/ сут.	-41.3	-0.2	2.8	0.4

18-24.08

Регион	Карское море	Сектор 95°E-170°W	Море Лаптевых	Восточно-Сибирское море
Разность	-3.6	-46.9	-29.2	-28.3
тыс.кв.км/ сут.	-0.5	-6.7	-4.2	-4.0

18-24.08

Регион	Чукотское море	Берингово море	Сектор 170°W-45°W	Море Бофорта
Разность	1.5	1.4	-240.8	-54.9
тыс.кв.км/ сут.	0.2	0.2	-34.4	-7.8

18-24.08

Регион	Гудзонов залив	Море Лабрадор	Дейвисов пролив	Канадский архипелаг
Разность	4.1	1.1	-5.5	-35.4
тыс.кв.км/ сут.	0.6	0.2	-0.8	-5.1

18-24.08

Регион	Южный Океан	Атлантический сектор	Западная часть моря Уэдделла	Восточная часть моря Уэдделла
Разность	327.0	200.7	45.6	155.1
тыс.кв.км/ сут.	46.7	28.7	6.5	22.2

18-24.08

Регион	Индоокеанский сектор	Море Космонавтов	Море Содружества	Море Моусона
Разность	95.7	-1.4	16.6	80.4
тыс.кв.км/ сут.	13.7	-0.2	2.4	11.5

18-24.08

Регион	Тихоокеанский сектор	Море Росса	Море Беллинсгаузена	
Разность	30.6	118.5	-87.9	
тыс.кв.км/ сут.	4.4	16.9	-12.6	

Характеристика исходного материала и методика расчетов

Для иллюстрации ледовых условий Арктического региона представлены совмещенные региональные карты ААНИИ [4, 6], Канадской ледовой службы – КЛС [12], Национального ледового центра США – НЛЦ [10], Ледовой службы отделения Аляска НОАА [23] и НИЦ Планета [9]. Совмещение карт выполнено путем перекрытия слоев отдельных ледовых служб в зависимости от времени ледового анализа. Карты ААНИИ характеризуют ледовые условия морей Гренландского...Бофорта, карты НИЦ Планета – Азовского, Каспийского, Берингова, Охотского, Японского, карты НЛЦ – Северных частей Тихого и Атлантического океанов и Арктического бассейна, вод Гренландии, Ледовой службы отделения Аляска НОАА – Берингово, Чукотское моря, КЛС – морей Бофорта, Канадского архипелага, Баффина, Девисова пролива, Лабрадор, Св. Лаврентия. Для ледовых условий и распределения айсбергов Южного океана использованы данные проекта по интегрированному ледовому анализу Южного океана – циркумполярные карты ААНИИ [5, 7], НЛЦ [10, 11] и карты акватории Антарктического полуострова Норвежского метеорологического института (НМИ) [21]. Для построения совмещенных карт используется архив данных в обменном формате ВМО СИГРИД-3 [18] Мирового центра данных по морскому льду (МЦД МЛ) – проекта ВМО «Глобальный Банк Цифровых Данных по Морскому Льду». В пределах отдельного срока выборка карт из архива проводится по критериям близости карт к сроку выпуска карты ААНИИ с максимальным интервалом времени между картами до 7 суток (день недели выпуска карт ААНИИ – вторник, Ледовой службы отделения Аляска НОАА – ежедневно, НИЦ Планета – понедельник-четверг, КЛС – понедельник, НЛЦ – четверг/пятница для морского льда и четверг/пятница – для крупных айсбергов Южного океана, НМИ – понедельник).

Для иллюстрации полей толщин льда СЛО использованы ежедневные данные по распределению средневзвешенной толщины льда численной модели НУСОМ-CICE Датского метеорологического института (ДМИ) [20]. Численная модель НУСОМ-CICE имеет разрешение 10x10 км и является совместной моделью морского льда – океана. Портал полярных данных ДМИ [22] используется также как источник данных по оценке объема льда СЛО, температуры поверхности океана/морского льда, аномалий температуры воздуха и поля приземного ветра.

Для иллюстрации ледовых условий Северной Полярной области и Южного океана за последние сутки используются ежедневные циркумполярные ледовые информационные продукты НЛЦ США по оценке расположения кромки льда и ледяных массивов - MIZ (Marginal Ice Zone).

Для цветовой окраски карт использован стандарт ВМО (WMO/Td. 1215) [19] для зимнего (по возрасту) и летнего (по общей сплоченности) периодов. Следует также отметить, что в зонах стыковки карт ААНИИ, Ледовой службы отделения Аляска НОАА, КЛС и НЛЦ наблюдается определенная несогласованность границ и характеристик ледовых зон вследствие ряда различий в ледовых информационных системах подготавливающих служб. Однако, данная несогласованность несущественна для целей интерпретации ледовых условий в рамках настоящего обзора.

Для оценки распределения толщин льда в морях СМП использованы совмещенные недельные данные дистанционного зондирования ИСЗ Cryosat-2 и Sentinel-3A,B (радиолокационная альтиметрия) и SMOS (пассивное микроволновое зондирование), подготавливаемые Институтом полярных исследований им. А.Вегенера (AWI) [24].

Для получения оценок ледовитости (extent) и приведенной ледовитости – площади льда (area) отдельных секторов, морей, частей морей Северной полярной области и Южного океана и климатического положения кромок заданной повторяемости на основе данных спутниковых систем пассивного микроволнового зондирования SSMR-SSM/I-SSMIS [17] в МЦД МЛ ААНИИ принята следующая технология расчетов:

- источник данных – архивные (Cavalieri et al., 2008, Meier et al., 2006) и квазиоперативные (Maslanik and Stroeve, 1999) с задержкой 1-2 дня ежедневные матрицы (поля распределения) оценок общей сплоченности Северной (севернее 45° с.ш.) и Южной

(южнее 50° с.ш.) Полярных областей на основе обработанных по алгоритму NASATEAM данных многоканальных микроволновых радиометров SSMR-SSM/I-SSMIS ИСЗ NIMBUS-7 и DMSP за период с 26.10.1978 г. по настоящий момент времени [13, 14, 15], копируемые с сервера НЦДСЛ;

- область расчета – Северная и Южная Полярные области и их регионы с использованием масок океан/суша НЦДСЛ (http://nsidc.org/data/polar_stereo/tools_masks.html);
- границы используемых масок расчета отдельных меридиональных секторов, морей, частей морей Северной полярной области и Южного океана представлены на рисунках П1 – П6 в полярной равноплощадной проекции Ламберта [26], не совпадают с используемыми в НЦДСЛ масками для отдельных акваторий Мирового океана и основаны на цифровой основе Международной гидрографической организации [25], повторяющей по номенклатуре, но не совпадающей по границам (вследствие отсутствия цифровосновы) публикациям «Атлас Северного ледовитого океана (1980)» и «Атлас океанов» [1, 2, 3].
- вычислительные особенности расчета – авторское программное обеспечение ААНИИ с сохранением точности расчетов и оценке статистических параметров по гистограмме распределения и свободно-распространяемое программное обеспечение GDAL для векторизации полей климатических параметров;

В графическом формате PNG совмещенные карты ААНИИ-КЛС-НЛЦ Ледовой службы отделения Аляска НОАА доступны по адресу <http://wdc.aari.ru/datasets/d0040>.

Результаты расчетов ледовитости Северной, Южной полярных областей, их отдельных меридиональных секторов, морей и частей морей доступны на сервере МЦД МЛ ААНИИ в каталогах соответственно <http://wdc.aari.ru/datasets/ssmi/data/north/extent/> и <http://wdc.aari.ru/datasets/ssmi/data/south/extent/>.

Оценки толщины льда основаны на совмещенных альтиметрических и пассивных микроволновых данных ИСЗ CryoSAT-2, SMOS и Sentinel-3 [27], описание алгоритма обработки приведено в [28].




Рисунок П1 – Секторальное деление северной полярной области. 1 - Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря); 2 - Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика); 3 - Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское, Японское)




Рисунок П2 – Северный ледовитый океан в официальных границах




Рисунок П3 – моря северной полярной области. 1 – Арктический бассейн; 2- Баренцево море; 3 – Карское море; 4 – море Лаптевых; 5 - Восточно-Сибирское море; 6 – Чукотское море; 7 – море Бофорта; 8 – Канадский архипелаг; 9 – море Линкольна; 10 – Гренландское море; 11 – Норвежское море; 12 – Балтийское море; 13 – Белое море; 14 – Берингово море; 15 – Охотское море; 16 – Японское море; 17 – море Баффина; 18 – Дейвисов пролив; 19 – море Лабрадор; 20 – залив Святого Лаврентия; 21 – Гудзонов залив.




Рисунок П4 – Сектора и моря северной полярной области. 1 - Белое море; 2- Балтийское море; 3 – Баренцево море (СВ); 4 – Баренцево море (З); 5 - Баренцево море (ЮВ); 6 – Карское море (СВ); 7 – Карское море (ЮЗ); 8 – море Лаптевых (В); 9 – море Лаптевых (З); 10 – Восточно-Сибирское море (З); 11 – Восточно-Сибирское море (В); 12 –Чукотское море; 13 –Берингово море; 14 – Охотское море; 15 –Гренландское море; 16 – Норвежское море; 17 – Канадский архипелаг; 18 – Гудзонов залив; 19 – Дейвисов пролив; 20 - море Баффина; 21 – море Лабрадор; 22 - залив Святого Лаврентия; 23 - море Линкольна; 24 - море Бофорта; 25 - Японское море; 26 - сектор АО (30°з.д. – 10°в.д.); 27 – сектор АО (10°в.д. – 30°в.д.); 28 - сектор АО (30°в.д. – 65°в.д.); 29 - сектор АО (65°в.д. – 96°в.д.);30 - сектор АО (96°в.д. – 140°в.д.);31 - сектор АО (140°в.д. – 180°в.д.); 32 - сектор АО (180°в.д. – 156°з.д.); 33 - сектор АО (156°з.д. – 123°з.д.); 34 - сектор АО (123°з.д. – 30°з.д.).




Рисунок П5 – Секторальное деление Южного океана. 1 - Атлантический сектор (60°W-30°E, море Уэдделла); 2 - Индоокеанский сектор (30°E-150°E, моря Космонавтов, Содружества, Моусона); 3 - Тихоокеанский сектор (150°E-60°W, моря Росса, Беллинсгаузена)




Рисунок П6 – Моря Южного океана. 1 – Западная часть моря Уэдделла; 2- Восточная часть моря Уэдделла; 3 – Море Космонавтов; 4 – море Содружества; 5 – море Моусона; 6 – море Росса; 7 – Море Беллинсгаузена.

Список источников

1. Атлас океанов. Северный Ледовитый океан. – 1980. М: Изд. ГУНИО МО СССР ВМФ – 184 с.
2. Атлас океанов. Термины. Понятия. Справочные таблицы. - Изд. ВМФ МО СССР.-1980.
3. Границы океанов и морей. – 1960. Л.: Изд. ГУНИО ВМФ. – 51 с.
4. Обзорные ледовые карты ФГБУ «АНИИ» Северного Ледовитого океана за 2008 – настоящий момент времени в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0015>.
5. Комплексные ледовые карты ФГБУ «АНИИ» Южного океана за 2014 год – настоящий момент времени в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0015>.
6. Комплексные ледовые карты ФГБУ «АНИИ» арктических и замерзающих морей России за 1997 – 2021 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0004>.
7. Карты ФГБУ «АНИИ» анализа крупных айсбергов Южного океана за 2014-2020 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0015>.
8. Комплексные ледовые карты ФГБУ «Гидрометцентр России» Азовского, Каспийского и Белого морей за 2000-2019 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0033>.
9. Комплексные ледовые карты ФГБУ «НИЦ Планета» Азовского, Каспийского, Берингова, Охотского и Японского морей за 2016 год – настоящий момент времени в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0034>.
10. Комплексные ледовые карты Северной полярной области и Южного океана Национального ледового центра США за 2003 год – настоящий момент времени в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0032>.
11. Карты анализа крупных айсбергов Южного океана Национального ледового центра США за 2014 год – настоящий момент времени в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0032>.
12. Комплексные ледовые карты Канадской Арктики Канадской ледовой службы за 2006 – настоящий момент времени в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0031>.
13. Cavalieri, D., C. Parkinson, P. Gloersen, and H. J. Zwally. 1996, updated 2008. *Sea Ice Concentrations from Nimbus-7 SMMR and DMSP SSM/I Passive Microwave Data*, [1978.10.26 – 2007.12.31]. Boulder, Colorado USA: National Snow and Ice Data Center. Digital media.
14. Meier, W., F. Fetterer, K. Knowles, M. Savoie, M. J. Brodzik. 2006, updated quarterly. *Sea Ice Concentrations from Nimbus-7 SMMR and DMSP SSM/I Passive Microwave Data*, [2008.01.01 – 2008.03.25]. Boulder, Colorado USA: National Snow and Ice Data Center. Digital media.
15. Maslanik, J., and J. Stroeve. 1999, updated daily. *Near-Real-Time DMSP SSM/I-SSMIS Daily Polar Gridded Sea Ice Concentrations*, [2008.03.26 – present moment]. Boulder, Colorado USA: National Snow and Ice Data Center. Digital media.
16. Andersen, S., R. Tonboe, L. Kaleschke, G. Heygster, and L. T. Pedersen, Intercomparison of passive microwave sea ice concentration retrievals over the high-concentration Arctic sea ice.// J. Geophys. Res. – 2007. – Vol. 112. C08004, doi:10.1029/2006JC003543.
17. Статистические характеристики сплоченности морского льда Северной полярной области и Южного океана на основе данных наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по

морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/ssmi>.

18. SIGRID-3: A vector archive format for Sea Ice Georeferenced Information and Data - JCOMM Technical Report Series No. 23, 2014, WMO/TD-No.1214.

19. Ice Chart Colour Code Standard. - JCOMM Technical Report Series No. 24, 2004, WMO/TD-No.1215.

(http://jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=4914)

20. Danish Meteorological Institute North Atlantic - Arctic Ocean model HYCOM-CICE - <http://ocean.dmi.dk/models/hycom.uk.php>

21. Портал данных ледового анализа Южного океана Норвежского метеорологического института - <http://polarview.met.no/Antarctic.html>

22. Портал полярных данных Датского метеорологического института - <http://polarportal.dk>

23. Комплексные ледовые карты Берингова и чукотского морей Ледовой службы отделения НОАА Аляска в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // <https://www.weather.gov/>.

24. AWI CryoSat-SMOS Merged Sea Ice Thickness - <https://spaces.awi.de/display/CS2SMOS/CryoSat-SMOS+Merged+Sea+Ice+Thickness>

25. Flanders Marine Institute (2018). IHO Sea Areas, version 3. Available online at URL: <http://www.marineregions.org/> (дата обращения 08.04.2023).

26. Полярная равноплощадная проекция Ламберта. URL: <https://epsg.io/3576> (дата обращения 07.04.2023).

27. ESA project SMOS & CryoSat-2 Sea Ice Data Product Processing and Dissemination Service and data from 2010 to 2024, obtained from <https://www.meereisportal.de> (grant: REKLIM-2013-04)/ Ricker, R., Hendricks, S., Kaleschke, L., Tian-Kunze, X., King, J., and Haas, C.:

28. A weekly Arctic sea-ice thickness data record from merged CryoSat-2 and SMOS satellite data, The Cryosphere, 11, 1607-1623, <https://doi.org/10.5194/tc-11-1607-2017>, 2017.

29. Kimura, N., M. Oyama, T. Sugimura, 2022, Daily Polar Gridded Sea Ice Age, Version 1, 1.00, Arctic Data archive System (ADS), Japan, <https://ads.nipr.ac.jp/dataset/A20220527-001>