

ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт»
Мировой центр данных по морскому льду (МЦД МЛ)





ААНИИ

Арктический и антарктический
научно-исследовательский институт

Информационные материалы по мониторингу морского ледяного покрова
Арктики и Южного Океана на основе данных ледового картирования и
пассивного микроволнового зондирования SSMR-SSM/I-SSMIS-AMSR₂

06.07.2026 – 14.07.2026

№ 28(771)



Санкт-Петербург 2026

тел. +7(812)337-3149, эл. почта: vms@aari.ag

Адрес в сети Интернет: <http://wdc.aari.ru/datasets/doo42/>

Примечание: Настоящий информационный продукт МЦД МЛ ААНИИ, включая его составляющие, не относится к информационным ресурсам ЕСИМО, нацелен на климатический мониторинг Северной и Южной полярных областей и не предназначен для использования в навигационных целях

Содержание

Северное Полушарие	3
Рисунок 1а – Обзорная ледовая карта СЛО (цветовая раскраска по общей сплоченности).	3
Рисунок 1б – Обзорная ледовая карта СЛО (цветовая раскраска по преобладающему возрасту).	4
Рисунок 1в – Мозаика снимков Sentinel-1 и положение крупных полыней по данным AMSR2	5
Рисунок 1г – Поле дрейфа морского льда СЛО по данным AMSR2	6
Рисунок 2а - Оценка толщины льда и степени разрушенности по данным AMSR2.....	7
Рисунок 2б - Оценка толщины льда на основе данных ИСЗ CryoSat-2-SMOS-S3.....	Error! Bookmark not defined.
Рисунок 3а – Обзорная ледовая карта СМП.	8
Рисунок 3б - Оценка толщины льда и, мозаика радиолокационных снимков СМП	8
Рисунок 4а – Ледовые условия за текущий и аналогичные периоды 2007-2025 гг.	9
Рисунок 4б – Оценка возраста льда (сутки) за 2018 – 2026 гг. по данным AMSR2.....	10
Рисунок 4в – Поля распределения модельной ошшины льда за 2005-2026 гг.	11
Рисунок 4г – Ежедневные оценки сезонного хода объема морского льда СЛО	12
Рисунок 5а – Аномалии приземной температуры воздуха и поверхности моря за последние сутки.	13
Рисунок 5б – Аномалии приземной температуры воздуха за последнюю пентаду 2023-2026 гг.....	14
Рисунок 5в – Аномалии приземной суммы осадков за последнюю пентаду 2023-2026 гг.	15
Таблица 1 - Медианные значения ледовитости по акваториям Северной полярной области	16
Таблица 2 – Экстремальные значения ледовитости по акваториям Северной полярной области	17
Таблица 3 – Динамика изменения значений ледовитости по акваториям Северной полярной области	17
Рисунок 6а – Ежедневные оценки ледовитости по акваториям Северной Полярной Области	19
Рисунок 6б – Ежедневные оценки сезонной ледовитости Северной Полярной Области	20
Южный океан	21
Рисунок 7а – Ледовая карта Южного океана (цветовая окраска по общей сплоченности)	21
Рисунок 7б – Ледовая карта Южного океана (цветовая окраска по возрасту)	22
Рисунок 7в – Положение кромки льда и зон разреженных морского льда Южного океана.....	23
Рисунок 7г – Поле дрейфа морского льда Южного океана по данным AMSR2	24
Рисунок 8 – Оценка возраста льда Южного океана по данным AMSR2	26
Рисунок 9 – Аномалии приземной температуры воздуха и поверхности океана за текущие сутки.	27
Таблица 4 – Линейные размеры и площадь крупных айсбергов Южного океана	28
Рисунок 10а – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости акваторий Южного Океана.....	29
Рисунок 10б – Ежедневные оценки сезонных изменений ледовитости Южного океана за период.....	30
Таблица 5 – Медианные и экстремальные значения ледовитости Южного океана.....	31
Таблица 6 – Динамика изменения значений ледовитости морей Южного океана	31
Рисунок 11а – Среднегодовая сглаженная ледовитость Арктики, Антарктики и Земли в целом	32
Рисунок 11б – Среднегодовая сглаженная площадь морского льда Арктики, Антарктики и Земли в целом.....	33
Рисунок 11в – Среднегодовая сглаженная общая сплоченность Арктики и Антарктики.....	34
Таблица 8 – Средние, аномалии среднего и экстремальные значения ледовитостей для Северной и Южной полярных областей и её отдельных акваторий.....	35
Таблица 10 – Динамика изменения ледовитости морей Северной полярной области и Южного океана	39
Характеристика исходного материала и методика расчетов	40
Список источников	45

Северное Полушарие




Рисунок 1а – Обзорная ледовая карта СЛО за 02.07.2026 – 14.07.2026 (цветовая раскраска по общей сплоченности) на основе ледового анализа NOAA Аляска, ААНИИ и Национального ледового центра США и повторяемость кромки за соответствующий 5-дневный период за 1991-2020 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM) [4, 10, 23, 17].




Рисунок 16 – Обзорная ледовая карта СЛО за 02.07.2026 – 14.07.2026 (цветовая раскраска по преобладающему возрасту) на основе ледового анализа НОАА Аляска, ААНИИ и Национального ледового центра США и повторяемость кромки за соответствующий 5-дневный период за 1991-2020 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM) [4, 10, 23, 17].




Рисунок 1в – Мозаика снимков Sentinel-1 (DTU) за 08.07.2026 – 14.07.2026, общая сплоченность и оценка положения полыней за 14.07.2026 г. по данным AMSR2 (AWI-JAXA), повторяемость кромки за соответствующий 5-дневный период за 1991-2020 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM) и положение РСН СП-42 на 15.07.2025 г. 06:00МСК.




Рисунок 1г – Поле дрейфа морского льда Северной полярной области за последний доступный срок по данным AMSR2, источник JAXA [29].







Рисунок 2а - Оценка толщины льда и степени разрушенности на основе данных пассивного микроволнового зондирования AMSR2 12.07 в 2018 – 2026 гг. [29].







2007




2012




2014




2020




2022




2023



2024




2025




2026


Рисунок 4а – Ледовые условия за 12.07 - 14.07.2026. и аналогичные периоды 2007-2025 гг. на основе ледового анализа ААНИИ, НИЦ Планета, Канадской ледовой службы, Национального ледового центра США и НОАА Аляска [4, 10, 12, 23, 17].




2026



2022




2020




2018


Рисунок 46 – Оценка максимального возраста льда (сутки) на 12.07 за 2018 – 2026 гг. по данным JAXA-NIPR [29]




2026




2025




2024




2023




2022




2020




2016




2014




2013



2012



2007



2005

Рисунок 4в – Поля распределения средневзвешенной толщины льда совместной модели морского льда – океана HYCOM/CICE Датского метеорологического института 14.07 за 2005-2026 гг. [22].




Рисунок 4г – Ежедневные оценки сезонного хода объема морского льда СЛО на основе расчетов средневзвешенной толщины льда совместной модели морского льда – океана HYCOM/CICE Датского метеорологического института с 28.02.2004 по последний доступный срок [22].





Рисунок 5а – Аномалия приземной температуры воздуха (2м) и температуры поверхности моря на 13.06.2026 г. относительно периода 1991-2020 гг. - The [Copernicus Climate Change Service \(C3S\)](#), implemented by the [European Centre for Medium-Range Weather Forecasts \(ECMWF\)](#) on behalf of the European Commission is part of the European Union's space programme




Рисунок 5б – Аномалии приземной температуры воздуха (2м) и осредненные вектора скорости ветра (10 м) за последнюю пентаду 2022-2025 гг. относительно периода 2004-2013 гг. (<http://polarportal.dk>) [22]




Рисунок 5в – Аномалии приземной суммы осадков за последнюю пентаду 2022-2025 гг. относительно периода 2004-2013 гг [22].

Таблица 1 - Медианные значения ледовитости для Северной полярной области, 3-х меридиональных секторов и морей СМП за текущие 30 и 7-дневные интервалы, и её аномалии от 2020-2024 гг. и интервалов 2015-2025 гг. и 1978-2025 гг. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритмы NASATEAM [13-17]


Северная полярная область								
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2016-2026гг	1978-2026гг
13.06-12.07	9661.4	-37.1	-353.0	-448.1	-461.8	49.0	-137.9	-1019.1
		-0.4	-3.5	-4.4	-4.6	0.5	-1.4	-9.5
06-12.07	8606.5	240.8	-423.4	-452.5	-394.6	79.2	-67.7	-1074.6
		2.9	-4.7	-5.0	-4.4	0.9	-0.8	-11.1
Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря)								
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2016-2026гг	1978-2026гг
13.06-12.07	1859.8	-297.1	-209.0	-452.2	-574.1	41.4	-254.8	-752.4
		-13.8	-10.1	-19.6	-23.6	2.3	-12.1	-28.8
06-12.07	1465.0	-366.0	-331.0	-564.6	-589.2	4.0	-330.6	-860.1
		-20.0	-18.4	-27.8	-28.7	0.3	-18.4	-37.0
Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское)								
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2016-2026гг	1978-2026гг
13.06-12.07	3276.9	368.9	127.1	8.3	120.1	33.8	151.1	5.4
		12.7	4.0	0.3	3.8	1.0	4.8	0.2
06-12.07	3091.5	606.3	131.7	-24.3	269.5	-17.3	227.9	12.8
		24.4	4.4	-0.8	9.5	-0.6	8.0	0.4
Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика)								
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2016-2026гг	1978-2026гг
13.06-12.07	4524.7	-108.9	-271.1	-4.3	-7.7	-26.2	-34.3	-272.2
		-2.4	-5.7	-0.1	-0.2	-0.6	-0.8	-5.7
06-12.07	4049.9	0.4	-224.1	136.3	-74.8	92.5	34.6	-227.4
		0.0	-5.2	3.5	-1.8	2.3	0.9	-5.3
Северный Ледовитый океан								
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2016-2026гг	1978-2026гг
13.06-12.07	9125.3	-11.3	-208.4	-309.0	-296.1	114.3	-117.5	-965.6
		-0.1	-2.2	-3.3	-3.1	1.3	-1.3	-9.6
06-12.07	8170.6	204.7	-317.9	-416.8	-294.7	64.5	-91.8	-1125.6
		2.6	-3.7	-4.9	-3.5	0.8	-1.1	-12.1
Моря СМП (моря Карское-Чукотское)								
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2016-2026гг	1978-2026гг
13.06-12.07	2452.9	361.0	192.8	-47.3	-67.4	222.0	186.6	-121.9
		17.3	8.5	-1.9	-2.7	10.0	8.2	-4.7
06-12.07	2075.3	536.0	148.1	-160.1	38.7	122.4	217.0	-252.9
		34.8	7.7	-7.2	1.9	6.3	11.7	-10.9

Таблица 2 – Экстремальные и средние значения ледовитости для Северной полярной области, 3 меридиональных секторов и моря СМП за текущий 7-дневный интервал по данным наблюдений [13-17]


Северная полярная область				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
06-12.07	7922.8 12.07.2019	11286.3 06.07.1983	9681.1	9692.2
Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря)				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
06-12.07	1339.3 12.07.2026	3187.7 06.07.1981	2325.1	2329.0
Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское)				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
06-12.07	2246.1 12.07.2020	3357.0 06.07.1985	3078.7	3137.5
Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика)				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
06-12.07	3421.0 12.07.2012	5327.9 06.07.1983	4277.4	4214.5
Северный Ледовитый океан				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
06-12.07	7516.8 12.07.2020	10761.0 06.07.1982	9296.2	9355.0
Моря СМП (моря Карское-Чукотское)				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
06-12.07	1064.4 12.07.2020	2910.4 06.07.1983	2328.2	2366.8

Таблица 3 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Северной полярной области за 06.07 – 12.07.2026 г. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SMIS [13-17]


Регион	Северная полярная область	Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря)	Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское)	Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика)	Северный Ледовитый океан	Моря СМП (моря Карское-Чукотское)
Разность	-507.6	-224.3	-151.8	-131.5	-495.5	-242.4
тыс. кв. км/сут.	-72.5	-32.0	-21.7	-18.8	-70.8	-34.6




a)




б)




B)



г)



д)



е)

Рисунок 6а – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости для Северной Полярной Области и трех меридиональных секторов, СЛО и морей СМП за период 26.10.1978 – последний доступный срок по годам на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритмы NASATEAM: а) Северная полярная область, б) сектор 45°W-95°E (Гренландское – Карское моря), в) сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых – Чукотское и Берингово, Охотское), г) сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика), д) Северный Ледовитый океан, е) Северный морской путь (Карское - Чукотское моря) [13-17].




Рисунок 66 – Ежедневные оценки сезонных изменений ледовитости для Северной Полярной Области за период 26.10.1978 – последний доступный срок на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM [13-17].

Южный океан




Рисунок 7а – Ледовая карта Южного океана (цветовая окраска по общей сплоченности) и расположение крупных айсбергов на основе ледового анализа за 09.07.2026 в рамках проекта совместного ледового картирования Южного океана ААНИИ, НЛЦ США и НМИ и повторяемость кромки за ближайшую пентаду за период 1991-2020 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM) [5, 10, 17, 21]

h




Рисунок 76 – Ледовая карта Южного океана (цветовая окраска по возрасту) и расположение крупных айсбергов на основе ледового анализа за 09.07.2026 в рамках проекта совместного ледового картирования Южного океана ААНИИ, НЛЦ США и НМИ и повторяемость кромки за ближайшую пентаду за период 1991-2020 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM) [5, 10, 17, 21].




Рисунок 7в – Положение кромки льда и зон разреженных ($<8/10$) и сплошных ($\geq 8/10$) льдов Южного океана за 14.07.2026 и расположение крупных айсбергов за 10.07.2026 на основе ледового анализа Национального Ледового Центра США, повторяемость кромки за ближайшую пентаду за период 1991-2020 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM), совмещенное с положением разрежений на основе данных ИСЗ AMSR2 за 14.07.2026 (AWI-JAXA, v110) [10, 17, 24]




Рисунок 7г – Поле дрейфа морского льда Южного океана за последний доступный срок по данным AMSR2, источник JAXA [29]











Рисунок 8а - Оценка толщины льда и степени разрушенности на основе данных пассивного микроволнового зондирования AMSR2 12.07 в 2018 – 2026 гг. [29].




2026



2022



2020



2018

Рисунок 86 – Оценка максимального возраста льда (сутки) на 12.07 за 2018 – 2026 гг. по данным JAXA-NIPR [29]







Рисунок 9 – Аномалия приземной температуры воздуха (2м) на 13.07.2026 г. относительно периода 1991-2020 гг. - The [Copernicus Climate Change Service \(C3S\)](#), implemented by the [European Centre for Medium-Range Weather Forecasts \(ECMWF\)](#) on behalf of the European Commission is part of the European Union's space programme.

Таблица 4 – Линейные размеры и площадь крупных айсбергов Южного океана на основе анализа НЛЦ США за 03.04.2026 [11]



Имя	Длина км	Ширина км	Площадь кв.км	Имя	Длина км	Ширина км	Площадь кв.км
D15A	94.5	40.7	3049.4	A84	22.2	11.1	201.2
A81	51.9	46.3	1448.4	D15C	25.9	13.0	192.7
B22A	53.7	46.3	1436.1	A83	22.2	13.0	189.8
C36	42.6	29.6	855.8	D34	20.4	14.8	163.5
D33A	63.0	18.5	642.3	B09G	22.2	13.0	160.9
D15B	37.0	22.2	616.4	C18B	18.5	7.4	111.2
B09B	50.0	18.5	505.5	D23	13.0	11.1	110.4
D37	55.6	13.0	477.8	D32	16.7	11.1	103.7
D35	51.9	11.1	347.5	B22H	14.8	11.1	78.2
D33B	38.9	22.2	304.6	C30	16.7	5.6	76.3
A76C	29.6	13.0	297.1	C31	16.7	5.6	72.1
C21B	22.2	14.8	258.1	C39	14.8	7.4	69.8
B22F	25.9	13.0	247.8	A85	18.5	5.6	62.6
D33C	27.8	13.0	222.3	C24	20.4	5.6	62.3
C15	25.9	18.5	213.0	C18C	18.5	3.7	53.1

Суммарная площадь == **12630 кв. км** (06.02.2026 – 14264, 26.12.2025 - 14988, 21.11.2025 – 16405, 28.08.2025 – 17450, 18.07.2025 – 18106, 05.06.2025 – 18240, 02.05.2025 – 18445, 27.03.2025 – 18830, 21.02.2025 – 19222, 23.01.2025 – 18636 кв. км)



а)

б)



в)

г)

Рисунок 10а – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости Южного Океана и меридиональных секторов за период 26.10.1978 – последний доступный срок по годам на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM: а) Южный Океан, б) Атлантический сектор (60°W-30°E, море Уэдделла), в) Индоокеанский сектор (30°E-150°E, моря Космонавтов, Содружества, Моусона), г) Тихоокеанский сектор (150°E-60°W, моря Росса, Беллингаузена) [13-17]




Рисунок 106 – Ежедневные оценки сезонных изменений ледовитости для Южного океана за период 26.10.1978 – последний доступный срок на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM [13-17].

Таблица 5 – Медианные и экстремальные значения ледовитости для Южного океана и 3 меридиональных секторов за текущие 30 и 7-дневные интервалы и её аномалии от 2020-2024 гг. и интервалов 2015-2025 гг. и 1978-2025 гг. по данным наблюдений SSMR-SSM/I [13-17]

Южный Океан								
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2016-2026гг	1978-2026гг
13.06-12.07	13527.1	-1162.7	239.1	1609.4	691.8	245.7	-51.4	-803.7
		-7.9	1.8	13.5	5.4	1.9	-0.4	-5.6
06-12.07	14508.8	-1217.8	150.5	1747.0	644.6	256.3	-103.4	-797.7
		-7.7	1.0	13.7	4.6	1.8	-0.7	-5.2
Атлантический сектор (60°W-30°E, море Уэдделла)								
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2016-2026гг	1978-2026гг
13.06-12.07	5379.2	-408.3	423.9	947.8	219.7	-85.9	-14.3	-291.0
		-7.1	8.6	21.4	4.3	-1.6	-0.3	-5.1
06-12.07	5623.8	-577.1	196.1	744.5	-6.2	-297.0	-221.9	-458.3
		-9.3	3.6	15.3	-0.1	-5.0	-3.8	-7.5
Индоокеанский сектор (30°E-150°E, моря Космонавтов, Содружества, Моусона)								
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2016-2026гг	1978-2026гг
13.06-12.07	2646.1	-532.0	-170.8	336.5	92.8	0.3	-134.8	-357.8
		-16.7	-6.1	14.6	3.6	0.0	-4.8	-11.9
06-12.07	2952.7	-517.2	-205.9	384.6	106.4	115.5	-121.8	-334.0
		-14.9	-6.5	15.0	3.7	4.1	-4.0	-10.2
Тихоокеанский сектор (150°E-60°W, моря Росса, Беллинсгаузена)								
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2016-2026гг	1978-2026гг
13.06-12.07	5501.8	-222.4	-14.0	325.1	379.3	331.3	97.7	-154.9
		-3.9	-0.3	6.3	7.4	6.4	1.8	-2.7
06-12.07	5932.3	-123.5	160.3	618.0	544.4	437.7	240.3	-5.4
		-2.0	2.8	11.6	10.1	8.0	4.2	-0.1
Южный Океан								
Месяц	Минимальное знач.		Максимальное знач.		Среднее знач.		Медиана	
06-12.07	12371.0 06.07.2023		16827.9 12.07.2010		15306.5		15358.3	
Атлантический сектор (60°W-30°E, море Уэдделла)								
Месяц	Минимальное знач.		Максимальное знач.		Среднее знач.		Медиана	
06-12.07	4745.7 06.07.2023		7018.5 12.07.1992		6082.1		6105.0	
Индоокеанский сектор (30°E-150°E, моря Космонавтов, Содружества, Моусона)								
Месяц	Минимальное знач.		Максимальное знач.		Среднее знач.		Медиана	
06-12.07	2395.6 06.07.2023		3981.5 10.07.2006		3286.7		3304.8	
Тихоокеанский сектор (150°E-60°W, моря Росса, Беллинсгаузена)								
Месяц	Минимальное знач.		Максимальное знач.		Среднее знач.		Медиана	
06-12.07	5179.0 06.07.1980		6853.9 12.07.2013		5937.8		5955.0	

Таблица 6 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Южного океана за 06.07 – 12.07.2026 по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS [13-17]

Регион	Южный Океан	Атлантический сектор	Индоокеанский сектор	Тихоокеанский сектор
Разность	451.3	52.4	113.3	285.7
тыс.кв.км/сут.	64.5	7.5	16.2	40.8




Рисунок 11а – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения ледовитости (площади распространения морского льда) Арктики, Антарктики и Земли в целом с 26.10.1978 по последний доступный срок на основе SSMR-SSM/I-SSMIS [13-17]




Рисунок 116 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения приведенной ледовитости (площади морского льда) Арктики, Антарктики и Земли в целом с 25.10.1978 по последний доступный срок на основе SSMR-SSM/I-SSMIS [13-17]




Рисунок 11в – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения средней общей сплоченности Арктики и Антарктики с 07.11.1978 по последний доступный срок на основе SSMR-SSM/I-SSMIS [13-17]

Приложение 1 – Статистические значения ледовитостей по отдельным акваториям Северной Полярной Области и Южного океана

Таблица 8 – Средние, аномалии среднего и экстремальные значения ледовитостей для Северной и Южной полярных областей и её отдельных акваторий за текущие 7-дневный (неделя) и 30-дневный промежутки времени по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM за период 1978-2024 гг.

06-12.07

Регион	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%							1978-2026гг			
		2007 г	2012 г	2023 г	2024 г	2025 г	2016-2026гг	1978-2026гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Сев. полярная область	8606.5	-59.2	161.7	-452.5	-394.6	79.2	-67.7	-1074.6	7922.8	11286.3	9681.1	9692.2
		-0.7	1.9	-5.0	-4.4	0.9	-0.8	-11.1	12.07.2019	06.07.1983		
Сектор 45°W-95°E	1465.0	-644.7	-294.1	-564.6	-589.2	4.0	-330.6	-860.1	1339.3	3187.7	2325.1	2329.0
		-30.6	-16.7	-27.8	-28.7	0.3	-18.4	-37.0	12.07.2026	06.07.1981		
Гренландское море	277.5	-242.9	-282.1	-212.8	-193.2	-110.9	-130.1	-246.8	226.0	812.8	524.3	523.4
		-46.7	-50.4	-43.4	-41.0	-28.5	-31.9	-47.1	12.07.2026	07.07.1989		
Баренцево море	4.0	-113.2	-24.7	-77.7	-48.1	-34.7	-68.9	-227.5	1.9	605.7	231.5	186.3
		-96.6	-86.2	-95.1	-92.4	-89.7	-94.6	-98.3	08.07.2026	06.07.1982		
Карское море	318.9	-156.4	148.1	-112.9	-185.7	138.1	-34.7	-251.9	103.2	839.2	570.7	586.2
		-32.9	86.7	-26.1	-36.8	76.4	-9.8	-44.1	09.07.2025	06.07.1981		
Сектор 95°E-170°W	3091.5	338.0	18.3	-24.3	269.5	-17.3	227.9	12.8	2246.1	3357.0	3078.7	3137.5
		12.3	0.6	-0.8	9.5	-0.6	8.0	0.4	12.07.2020	06.07.1985		
Море Лаптевых	564.2	95.4	67.8	18.1	281.4	54.5	137.6	15.8	120.1	674.3	548.5	587.9
		20.3	13.7	3.3	99.5	10.7	32.2	2.9	12.07.2020	06.07.1986		
Восточно-Сибирское море	748.0	50.4	-81.3	-77.2	-54.4	-122.8	-2.2	-91.7	512.8	915.1	839.8	869.7
		7.2	-9.8	-9.4	-6.8	-14.1	-0.3	-10.9	12.07.2017	06.07.1994		
Чукотское море	444.2	213.0	28.3	12.0	-2.6	52.6	116.3	75.0	123.4	535.8	369.3	375.9
		92.1	6.8	2.8	-0.6	13.4	35.5	20.3	12.07.2019	06.07.1985		
Берингово море	4.0	0.4	1.6	-12.7	-8.4	-13.4	-8.1	-3.0	0.0	26.3	7.1	6.0
		9.7	62.6	-75.8	-67.6	-76.8	-66.7	-42.9	06.07.2008	07.07.2025		
Сектор 170°W-45°W	4049.9	247.5	437.4	136.3	-74.8	92.5	34.6	-227.4	3421.0	5327.9	4277.4	4214.5
		6.5	12.1	3.5	-1.8	2.3	0.9	-5.3	12.07.2012	06.07.1983		
Море Бофорта	483.9	145.2	282.2	182.2	158.0	29.3	121.5	104.1	99.8	486.6	379.8	406.4
		42.9	139.9	60.4	48.5	6.4	33.5	27.4	06.07.1998	06.07.2000		
Гудзонов залив	55.2	-37.4	-53.4	13.3	-116.0	-19.9	-125.7	-228.2	16.9	755.2	283.5	279.9
		-40.4	-49.2	31.7	-67.7	-26.5	-69.5	-80.5	10.07.2005	06.07.1992		
Море Лабрадор	10.5	5.3	1.7	5.0	-4.4	1.6	-0.6	-5.8	0.0	113.6	16.3	9.0
		103.0	19.8	91.9	-29.6	18.5	-5.1	-35.4	07.07.2000	06.07.1984		
Дейвисов пролив	174.3	1.5	60.8	-0.8	-2.1	-8.0	-11.0	-25.9	60.1	356.1	200.2	201.1
		0.9	53.5	-0.5	-1.2	-4.4	-5.9	-12.9	11.07.2014	06.07.1984		
Канадский архипелаг	895.0	16.6	-29.8	74.4	30.1	55.9	4.7	-71.9	764.8	1174.7	966.9	957.4
		1.9	-3.2	9.1	3.5	6.7	0.5	-7.4	12.07.2023	06.07.1983		

13.06-12.07

Регион	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%							1978-2026гг			
		2007 г	2012 г	2023 г	2024 г	2025 г	2016- 2026гг	1978- 2026гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Сев. полярная область	9661.4	-461.1	-12.5	-448.1	-461.8	49.0	-137.9	-1019.1	7922.8	12783.3	10680.5	10787.3
		-4.6	-0.1	-4.4	-4.6	0.5	-1.4	-9.5	12.07.2019	13.06.1979		
Сектор 45°W- 95°E	1859.8	-634.3	-181.0	-452.2	-574.1	41.4	-254.8	-752.4	1339.3	3706.0	2612.2	2652.2
		-25.4	-8.9	-19.6	-23.6	2.3	-12.1	-28.8	12.07.2026	13.06.1979		
Гренландское море	406.6	-210.2	-267.4	-189.6	-127.8	-70.8	-82.1	-192.7	226.0	882.3	599.3	608.9
		-34.1	-39.7	-31.8	-23.9	-14.8	-16.8	-32.2	12.07.2026	18.06.1981		
Баренцево море	22.9	-184.7	-37.0	-84.4	-147.8	-51.0	-98.3	-298.4	0.7	1055.7	321.3	293.8
		-89.0	-61.7	-78.6	-86.6	-69.0	-81.1	-92.9	30.06.2026	13.06.1979		
Карское море	521.1	-127.4	241.3	-49.4	-156.3	178.1	7.0	-149.7	103.2	839.2	670.9	735.6
		-19.6	86.2	-8.7	-23.1	51.9	1.4	-22.3	09.07.2025	13.06.1979		
Сектор 95°E- 170°W	3276.9	238.3	-15.4	8.3	120.1	33.8	151.1	5.4	2246.1	3615.2	3271.5	3298.8
		7.8	-0.5	0.3	3.8	1.0	4.8	0.2	12.07.2020	14.06.1994		
Море Лаптевых	617.7	104.9	41.3	27.5	132.8	81.8	98.4	23.7	120.1	674.3	594.0	627.8
		20.5	7.2	4.7	27.4	15.3	18.9	4.0	12.07.2020	13.06.1979		
Восточно- Сибирское море	826.9	23.5	-41.8	-38.3	-28.9	-63.2	-5.5	-48.5	512.8	915.1	875.4	900.2
		2.9	-4.8	-4.4	-3.4	-7.1	-0.7	-5.5	12.07.2017	13.06.1979		
Чукотское море	487.1	162.6	12.1	13.0	-15.1	25.3	86.8	52.6	123.4	597.3	434.5	442.5
		50.1	2.6	2.7	-3.0	5.5	21.7	12.1	12.07.2019	15.06.1985		
Берингово море	5.2	-17.9	-29.2	-20.6	-22.5	-29.2	-19.2	-25.8	0.0	114.2	31.0	27.1
		-77.6	-85.0	-80.0	-81.3	-85.0	-78.8	-83.3	01.07.1987	14.06.1992		
Сектор 170°W- 45°W	4524.7	-65.0	183.9	-4.3	-7.7	-26.2	-34.3	-272.2	3421.0	5845.0	4796.8	4856.7
		-1.4	4.2	-0.1	-0.2	-0.6	-0.8	-5.7	12.07.2012	13.06.1983		
Море Бофорта	481.2	65.2	189.7	101.5	124.2	8.7	86.0	66.4	99.8	486.6	414.8	444.7
		15.7	65.1	26.7	34.8	1.8	21.8	16.0	06.07.1998	13.06.1984		
Гудзонов залив	327.8	-99.3	-76.6	86.4	43.2	11.0	-58.9	-159.0	16.9	828.3	486.8	524.4
		-23.3	-18.9	35.8	15.2	3.5	-15.2	-32.7	10.07.2005	14.06.1992		
Море Лабрадор	10.1	-33.1	-6.2	-23.1	-4.3	-10.8	-10.1	-27.7	0.0	210.6	37.8	20.1
		-76.6	-38.1	-69.6	-29.7	-51.8	-49.9	-73.3	07.07.2000	15.06.1984		
Дейвисов пролив	209.6	-35.2	23.8	-51.6	-20.4	-28.3	-28.1	-40.4	60.1	408.5	250.0	250.3
		-14.4	12.8	-19.7	-8.9	-11.9	-11.8	-16.2	11.07.2014	13.06.1982		
Канадский архипелаг	949.2	-50.6	-47.6	3.8	15.9	1.2	-37.9	-95.8	764.8	1189.5	1045.0	1058.4
		-5.1	-4.8	0.4	1.7	0.1	-3.8	-9.2	12.07.2023	15.06.1979		

06-12.07

Регион	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%							1978-2026гг			
		2007 г	2012 г	2023 г	2024 г	2025 г	2016- 2026гг	1978- 2026гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Южный Океан	14508.8	-766.3	-1239.5	1747.0	644.6	256.3	-103.4	-797.7	12371.0	16827.9	15306.5	15358.3
		-5.0	-7.9	13.7	4.6	1.8	-0.7	-5.2	06.07.2023	12.07.2010		
Атлантический сектор	5623.8	-615.5	-703.5	744.5	-6.2	-297.0	-221.9	-458.3	4745.7	7018.5	6082.1	6105.0
		-9.9	-11.1	15.3	-0.1	-5.0	-3.8	-7.5	06.07.2023	12.07.1992		
Западная часть моря Уэдделла	2126.6	-424.3	-312.3	-78.5	-548.4	-62.2	-208.3	-258.6	2033.2	2894.4	2385.2	2366.3
		-16.6	-12.8	-3.6	-20.5	-2.8	-8.9	-10.8	11.07.1999	11.07.1992		
Восточная часть моря Уэдделла	3497.2	-191.1	-391.2	823.0	542.2	-234.7	-13.5	-199.6	2606.8	4321.5	3696.8	3738.1
		-5.2	-10.1	30.8	18.3	-6.3	-0.4	-5.4	09.07.2023	12.07.2004		
Индоокеанский сектор	2952.7	-197.5	-474.1	384.6	106.4	115.5	-121.8	-334.0	2395.6	3981.5	3286.7	3304.8
		-6.3	-13.8	15.0	3.7	4.1	-4.0	-10.2	06.07.2023	10.07.2006		
Море Космонавтов	638.9	-84.1	-176.6	160.0	99.4	268.9	-1.1	-86.8	349.9	1166.5	725.7	722.8
		-11.6	-21.7	33.4	18.4	72.7	-0.2	-12.0	07.07.2025	12.07.2010		
Море Содружества	1048.1	-140.5	19.0	243.6	137.0	21.7	21.4	-95.3	708.2	1489.2	1143.4	1148.7
		-11.8	1.8	30.3	15.0	2.1	2.1	-8.3	06.07.2023	12.07.2001		
Море Моусона	1265.7	27.1	-316.6	-19.0	-130.0	-175.2	-142.2	-151.9	1050.0	1746.3	1417.6	1419.5
		2.2	-20.0	-1.5	-9.3	-12.2	-10.1	-10.7	06.07.2002	06.07.1999		
Тихоокеанский сектор	5932.3	46.5	-61.9	618.0	544.4	437.7	240.3	-5.4	5179.0	6853.9	5937.8	5955.0
		0.8	-1.0	11.6	10.1	8.0	4.2	-0.1	06.07.1980	12.07.2013		
Море Росса	5336.6	319.2	341.1	670.7	859.0	191.5	398.4	331.8	3916.4	5767.1	5004.7	5008.9
		6.4	6.8	14.4	19.2	3.7	8.1	6.6	06.07.1980	11.07.2013		
Море Беллингаузена	595.8	-272.7	-402.9	-52.7	-314.6	246.2	-158.0	-337.2	311.4	1421.2	933.0	925.9
		-31.4	-40.3	-8.1	-34.6	70.4	-21.0	-36.1	10.07.2025	12.07.1995		

13.06-12.07

Регион	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%							1978-2026гг			
		2007 г	2012 г	2023 г	2024 г	2025 г	2016- 2026гг	1978- 2026гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Южный Океан	13527.1	-897.6	-1124.1	1609.4	691.8	245.7	-51.4	-803.7	10783.0	16827.9	14330.7	14398.3
		-6.2	-7.7	13.5	5.4	1.9	-0.4	-5.6	13.06.2023	12.07.2010		
Атлантический сектор	5379.2	-418.0	-512.0	947.8	219.7	-85.9	-14.3	-291.0	3795.2	7018.5	5670.2	5704.0
		-7.2	-8.7	21.4	4.3	-1.6	-0.3	-5.1	13.06.2023	12.07.1992		
Западная часть моря Уэдделла	2227.1	-209.5	-126.5	106.5	-367.9	32.8	-66.0	-105.5	1854.5	2894.4	2332.6	2332.3
		-8.6	-5.4	5.0	-14.2	1.5	-2.9	-4.5	15.06.1999	11.07.1992		
Восточная часть моря Уэдделла	3152.1	-208.5	-385.5	841.3	587.6	-118.6	51.8	-185.5	1858.0	4341.6	3337.6	3379.9
		-6.2	-10.9	36.4	22.9	-3.6	1.7	-5.6	14.06.2023	02.07.2003		
Индоокеанский сектор	2646.1	-410.0	-541.1	336.5	92.8	0.3	-134.8	-357.8	2050.8	3981.5	3003.9	3007.0
		-13.4	-17.0	14.6	3.6	0.0	-4.8	-11.9	16.06.2023	10.07.2006		
Море Космонавтов	516.6	-90.0	-252.9	110.4	30.0	199.8	-8.1	-94.4	219.1	1166.5	611.0	598.6
		-14.8	-32.9	27.2	6.2	63.1	-1.5	-15.4	13.06.1987	12.07.2010		
Море Содружества	903.9	-250.8	-82.5	173.7	92.1	-105.7	-37.8	-153.7	631.5	1489.2	1057.7	1061.8
		-21.7	-8.4	23.8	11.3	-10.5	-4.0	-14.5	14.06.2022	12.07.2001		
Море Моусона	1225.5	-69.2	-205.6	52.4	-29.3	-93.8	-89.0	-109.7	940.3	1772.3	1335.2	1321.5
		-5.3	-14.4	4.5	-2.3	-7.1	-6.8	-8.2	14.06.2023	03.07.1999		
Тихоокеанский сектор	5501.8	-69.6	-71.0	325.1	379.3	331.3	97.7	-154.9	4162.3	6853.9	5656.7	5667.0
		-1.2	-1.3	6.3	7.4	6.4	1.8	-2.7	13.06.1980	12.07.2013		
Море Росса	5085.2	210.7	438.5	467.5	861.2	222.0	349.5	269.5	3188.2	5767.1	4815.7	4846.4
		4.3	9.4	10.1	20.4	4.6	7.4	5.6	13.06.1980	11.07.2013		
Море Беллингаузена	416.6	-280.3	-509.5	-142.4	-481.8	109.3	-251.8	-424.4	95.4	1485.7	841.0	838.7
		-40.2	-55.0	-25.5	-53.6	35.6	-37.7	-50.5	13.06.2025	17.06.1991		

Таблица 10 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Северной полярной области и Южного океана за текущий 7-дневный (неделя) промежуток времени по данным наблюдений SSMIS

06-12.07

Регион	Сев. полярная область	Сектор 45°W-95°E	Гренландское море	Баренцево море
Разность	-507.6	-224.3	-87.5	0.0
тыс.кв.км/ сут.	-72.5	-32.0	-12.5	0.0

06-12.07

Регион	Карское море	Сектор 95°E-170°W	Море Лаптевых	Восточно-Сибирское море
Разность	-95.5	-151.8	-36.8	-80.6
тыс.кв.км/ сут.	-13.6	-21.7	-5.3	-11.5

06-12.07

Регион	Чукотское море	Берингово море	Сектор 170°W-45°W	Море Бофорта
Разность	-29.4	-1.9	-131.5	-0.4
тыс.кв.км/ сут.	-4.2	-0.3	-18.8	-0.1

06-12.07

Регион	Гудзонов залив	Море Лабрадор	Дейвисов пролив	Канадский архипелаг
Разность	-76.3	0.5	-18.6	-16.3
тыс.кв.км/ сут.	-10.9	0.1	-2.7	-2.3

06-12.07

Регион	Южный Океан	Атлантический сектор	Западная часть моря Уэдделла	Восточная часть моря Уэдделла
Разность	451.3	52.4	-95.9	148.2
тыс.кв.км/ сут.	64.5	7.5	-13.7	21.2

06-12.07

Регион	Индоокеанский сектор	Море Космонавтов	Море Содружества	Море Моусона
Разность	113.3	66.6	87.1	-40.5
тыс.кв.км/ сут.	16.2	9.5	12.4	-5.8

06-12.07

Регион	Тихоокеанский сектор	Море Росса	Море Беллинсгаузена	
Разность	285.7	143.0	142.8	
тыс.кв.км/ сут.	40.8	20.4	20.4	

Характеристика исходного материала и методика расчетов

Для иллюстрации ледовых условий Арктического региона представлены совмещенные региональные карты ААНИИ [4, 6], Канадской ледовой службы – КЛС [12], Национального ледового центра США – НЛЦ [10], Ледовой службы отделения Аляска НОАА [23] и НИЦ Планета [9]. Совмещение карт выполнено путем перекрытия слоев отдельных ледовых служб в зависимости от времени ледового анализа. Карты ААНИИ характеризуют ледовые условия морей Гренландского...Бофорта, карты НИЦ Планета – Азовского, Каспийского, Берингова, Охотского, Японского, карты НЛЦ – Северных частей Тихого и Атлантического океанов и Арктического бассейна, вод Гренландии, Ледовой службы отделения Аляска НОАА – Берингово, Чукотское моря, КЛС – морей Бофорта, Канадского архипелага, Баффина, Девисова пролива, Лабрадор, Св. Лаврентия. Для ледовых условий и распределения айсбергов Южного океана использованы данные проекта по интегрированному ледовому анализу Южного океана – циркумполярные карты ААНИИ [5, 7], НЛЦ [10, 11] и карты акватории Антарктического полуострова Норвежского метеорологического института (НМИ) [21]. Для построения совмещенных карт используется архив данных в обменном формате ВМО СИГРИД-3 [18] Мирового центра данных по морскому льду (МЦД МЛ) – проекта ВМО «Глобальный Банк Цифровых Данных по Морскому Льду». В пределах отдельного срока выборка карт из архива проводится по критериям близости карт к сроку выпуска карты ААНИИ с максимальным интервалом времени между картами до 7 суток (день недели выпуска карт ААНИИ – вторник, Ледовой службы отделения Аляска НОАА – ежедневно, НИЦ Планета – понедельник-четверг, КЛС – понедельник, НЛЦ – четверг/пятница для морского льда и четверг/пятница – для крупных айсбергов Южного океана, НМИ – понедельник).

Для иллюстрации полей толщин льда СЛО использованы ежедневные данные по распределению средневзвешенной толщины льда численной модели НУСОМ-CICE Датского метеорологического института (ДМИ) [20]. Численная модель НУСОМ-CICE имеет разрешение 10x10 км и является совместной моделью морского льда – океана. Портал полярных данных ДМИ [22] используется также как источник данных по оценке объема льда СЛО, температуры поверхности океана/морского льда, аномалий температуры воздуха и поля приземного ветра.

Для иллюстрации ледовых условий Северной Полярной области и Южного океана за последние сутки используются ежедневные циркумполярные ледовые информационные продукты НЛЦ США по оценке расположения кромки льда и ледяных массивов - MIZ (Marginal Ice Zone).

Для цветовой окраски карт использован стандарт ВМО (WMO/Td. 1215) [19] для зимнего (по возрасту) и летнего (по общей сплоченности) периодов. Следует также отметить, что в зонах стыковки карт ААНИИ, Ледовой службы отделения Аляска НОАА, КЛС и НЛЦ наблюдается определенная несогласованность границ и характеристик ледовых зон вследствие ряда различий в ледовых информационных системах подготавливающих служб. Однако, данная несогласованность несущественна для целей интерпретации ледовых условий в рамках настоящего обзора.

Для оценки распределения толщин льда в морях СМП использованы совмещенные недельные данные дистанционного зондирования ИСЗ Cryosat-2 и Sentinel-3A,B (радиолокационная альтиметрия) и SMOS (пассивное микроволновое зондирование), подготавливаемые Институтом полярных исследований им. А.Вегенера (AWI) [24, 27, 28] и ежедневные данные JAXA [29] на основе ИСЗ AMSR2 (пассивное микроволновое зондирование). Указанный источник [29] также использован для представления информации по дрейфу и возрасту морского льда СЛО и Южного океана.

Для получения оценок ледовитости (extent) и приведенной ледовитости – площади льда (area) отдельных секторов, морей, частей морей Северной полярной области и Южного океана и климатического положения кромок заданной повторяемости на основе данных спутниковых

систем пассивного микроволнового зондирования SSMR-SSM/I-SSMIS [17] и AMSR2 [30] в МЦД МЛ ААНИИ принята следующая технология расчетов:

- источник данных – архивные и квазиоперативные с задержкой 1-2 дня ежедневные матрицы (поля распределения) оценок общей сплоченности Северной (севернее 45° с.ш.) и Южной (южнее 50° с.ш.) Полярных областей на основе обработанных по алгоритму NASATEAM данных многоканальных микроволновых радиометров SSMR-SSM/I-SSMIS-AMSR2 за период с 26.10.1978 г. по настоящий момент времени [13, 14, 15, 30], копируемые с сервера НЦДСЛ;
- область расчета – Северная и Южная Полярные области и их регионы с использованием масок океан/суша НЦДСЛ (http://nsidc.org/data/polar_stereo/tools_masks.html);
- границы используемых масок расчета отдельных меридиональных секторов, морей, частей морей Северной полярной области и Южного океана представлены на рисунках П1 – П6 в полярной равноплощадной проекции Ламберта [26], не совпадают с используемыми в НЦДСЛ масками для отдельных акваторий Мирового океана и основаны на цифровой основе Международной гидрографической организации [25], повторяющей по номенклатуре, но не совпадающей по границам (вследствие отсутствия цифроосновы) публикациям «Атлас Северного ледовитого океана (1980)» и «Атлас океанов» [1, 2, 3].
- вычислительные особенности расчета – авторское программное обеспечение ААНИИ с сохранением точности расчетов и оценке статистических параметров по гистограмме распределения и свободно-распространяемое программное обеспечение GDAL для векторизации полей климатических параметров;

В графическом формате PNG совмещенные карты ААНИИ-КЛС-НЛЦ Ледовой службы отделения Аляска НОАА-НИЦ Планета доступны по адресу <http://wdc.aari.ru/datasets/d0040>.

Результаты расчетов ледовитости Северной, Южной полярных областей, их отдельных меридиональных секторов, морей и частей морей доступны на сервере МЦД МЛ ААНИИ в каталогах соответственно <http://wdc.aari.ru/datasets/ssmi/data/north/extent/> и <http://wdc.aari.ru/datasets/ssmi/data/south/extent/>.




Рисунок П1 – Секторальное деление северной полярной области. 1 - Сектор $45^{\circ}\text{W}-95^{\circ}\text{E}$ (Гренландское - Карское моря); 2 - Сектор $170^{\circ}\text{W}-45^{\circ}\text{W}$ (море Бофорта и Канадская Арктика); 3 - Сектор $95^{\circ}\text{E}-170^{\circ}\text{W}$ (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское, Японское)




Рисунок П2 – Северный ледовитый океан в официальных границах




Рисунок ПЗ – моря северной полярной области. 1 – Арктический бассейн; 2- Баренцево море; 3 – Карское море; 4 – море Лаптевых; 5 - Восточно-Сибирское море; 6 – Чукотское море; 7 – море Бофорта; 8 – Канадский архипелаг; 9 – море Линкольна; 10 – Гренландское море; 11 – Норвежское море; 12 – Балтийское море; 13 – Белое море; 14 – Берингово море; 15 – Охотское море; 16 – Японское море; 17 – море Баффина; 18 – Дейвисов пролив; 19 – море Лабрадор; 20 – залив Святого Лаврентия; 21 – Гудзонов залив.




Рисунок П4 – Сектора и моря северной полярной области. 1 - Белое море; 2- Балтийское море; 3 – Баренцево море (СВ); 4 – Баренцево море (З); 5 - Баренцево море (ЮВ); 6 – Карское море (СВ); 7 – Карское море (ЮЗ); 8 – море Лаптевых (В); 9 – море Лаптевых (З); 10 – Восточно-Сибирское море (З); 11 – Восточно-Сибирское море (В); 12 –Чукотское море; 13 –Берингово море; 14 – Охотское море; 15 –Гренландское море; 16 – Норвежское море; 17 – Канадский архипелаг; 18 – Гудзонов залив; 19 – Дейвисов пролив; 20 - море Баффина; 21 – море Лабрадор; 22 - залив Святого Лаврентия; 23 - море Линкольна; 24 - море Бофорта; 25 - Японское море; 26 - сектор АО (30°з.д. – 10°в.д.); 27 – сектор АО (10°в.д. – 30°в.д.); 28 - сектор АО (30°в.д. – 65°в.д.); 29 - сектор АО (65°в.д. – 96°в.д.);30 - сектор АО (96°в.д. – 140°в.д.);31 - сектор АО (140°в.д. – 180°в.д.); 32 - сектор АО (180°в.д. – 156°з.д.); 33 - сектор АО (156°з.д. – 123°з.д.); 34 - сектор АО (123°з.д. – 30°з.д.).




Рисунок П5 – Секторальное деление Южного океана. 1 - Атлантический сектор (60°W-30°E, море Уэдделла); 2 - Индоокеанский сектор (30°E-150°E, моря Космонавтов, Содружества, Моусона); 3 - Тихоокеанский сектор (150°E-60°W, моря Росса, Беллинсгаузена)




Рисунок П6 – Моря Южного океана. 1 – Западная часть моря Уэдделла; 2- Восточная часть моря Уэдделла; 3 – Море Космонавтов; 4 – море Содружества; 5 – море Моусона; 6 – море Росса; 7 – Море Беллинсгаузена.

Список источников

1. Атлас океанов. Северный Ледовитый океан. – 1980. М: Изд. ГУНИО МО СССР ВМФ – 184 с.
2. Атлас океанов. Термины. Понятия. Справочные таблицы. - Изд. ВМФ МО СССР.-1980.
3. Границы океанов и морей. – 1960. Л.: Изд. ГУНИО ВМФ. – 51 с.
4. Обзорные ледовые карты ФГБУ «АНИИ» Северного Ледовитого океана за 2008 – настоящий момент времени в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0015>.
5. Комплексные ледовые карты ФГБУ «АНИИ» Южного океана за 2014 год – настоящий момент времени в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0015>.
6. Комплексные ледовые карты ФГБУ «АНИИ» арктических и замерзающих морей России за 1997 – 2021 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0004>.
7. Карты ФГБУ «АНИИ» анализа крупных айсбергов Южного океана за 2014-2020 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0015>.
8. Комплексные ледовые карты ФГБУ «Гидрометцентр России» Азовского, Каспийского и Белого морей за 2000-2019 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0033>.
9. Комплексные ледовые карты ФГБУ «НИЦ Планета» Азовского, Каспийского, Берингова, Охотского и Японского морей за 2016 год – настоящий момент времени в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0034>.
10. Комплексные ледовые карты Северной полярной области и Южного океана Национального ледового центра США за 2003 год – настоящий момент времени в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0032>.
11. Карты анализа крупных айсбергов Южного океана Национального ледового центра США за 2014 год – настоящий момент времени в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0032>.
12. Комплексные ледовые карты Канадской Арктики Канадской ледовой службы за 2006 – настоящий момент времени в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0031>.
13. Cavalieri, D., C. Parkinson, P. Gloersen, and H. J. Zwally. 1996, updated 2008. *Sea Ice Concentrations from Nimbus-7 SMMR and DMSP SSM/I Passive Microwave Data*, [1978.10.26 – 2007.12.31]. Boulder, Colorado USA: National Snow and Ice Data Center. Digital media.
14. Meier, W., F. Fetterer, K. Knowles, M. Savoie, M. J. Brodzik. 2006, updated quarterly. *Sea Ice Concentrations from Nimbus-7 SMMR and DMSP SSM/I Passive Microwave Data*, [2008.01.01 – 2008.03.25]. Boulder, Colorado USA: National Snow and Ice Data Center. Digital media.
15. Maslanik, J., and J. Stroeve. 1999, updated daily. *Near-Real-Time DMSP SSM/I-SSMIS Daily Polar Gridded Sea Ice Concentrations*, [2008.03.26 – present moment]. Boulder, Colorado USA: National Snow and Ice Data Center. Digital media.
16. Andersen, S., R. Tonboe, L. Kaleschke, G. Heygster, and L. T. Pedersen, Intercomparison of passive microwave sea ice concentration retrievals over the high-concentration Arctic sea ice.// J. Geophys. Res. – 2007. – Vol. 112. C08004, doi:10.1029/2006JC003543.
17. Статистические характеристики сплоченности морского льда Северной полярной области и Южного океана на основе данных наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по

морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/ssmi>.

18. SIGRID-3: A vector archive format for Sea Ice Georeferenced Information and Data - JCOMM Technical Report Series No. 23, 2014, WMO/TD-No.1214.

19. Ice Chart Colour Code Standard. - JCOMM Technical Report Series No. 24, 2004, WMO/TD-No.1215.

(http://jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=4914)

20. Danish Meteorological Institute North Atlantic - Arctic Ocean model HYCOM-CICE - <http://ocean.dmi.dk/models/hycom.uk.php>

21. Портал данных ледового анализа Южного океана Норвежского метеорологического института - <http://polarview.met.no/Antarctic.html>

22. Портал полярных данных Датского метеорологического института - <http://polarportal.dk>

23. Комплексные ледовые карты Берингова и чукотского морей Ледовой службы отделения НОАА Аляска в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // <https://www.weather.gov/>.

24. AWI CryoSat-SMOS Merged Sea Ice Thickness - <https://spaces.awi.de/display/CS2SMOS/CryoSat-SMOS+Merged+Sea+Ice+Thickness>

25. Flanders Marine Institute (2018). IHO Sea Areas, version 3. Available online at URL: <http://www.marineregions.org/> (дата обращения 08.04.2023).

26. Полярная равноплощадная проекция Ламберта. URL: <https://epsg.io/3576> (дата обращения 07.04.2023).

27. ESA project SMOS & CryoSat-2 Sea Ice Data Product Processing and Dissemination Service and data from 2010 to 2024, obtained from <https://www.meereisportal.de> (grant: REKLIM-2013-04)/ Ricker, R., Hendricks, S., Kaleschke, L., Tian-Kunze, X., King, J., and Haas, C.:

28. A weekly Arctic sea-ice thickness data record from merged CryoSat-2 and SMOS satellite data, *The Cryosphere*, 11, 1607-1623, <https://doi.org/10.5194/tc-11-1607-2017>, 2017.

29. Kimura, N., M. Oyama, T. Sugimura, 2022, Daily Polar Gridded Sea Ice Age, Version 1, 1.00, Arctic Data archive System (ADS), Japan, <https://ads.nipr.ac.jp/dataset/A20220527-001>

30. Stewart, J. S., Meier, W. N., Marowitz, R., Scott, D. J. & Wilcox, H. (2025). *AMSR2 Daily Polar Gridded Sea Ice Concentrations*. (NSIDC-0803, Version 2). [Data Set]. Boulder, Colorado USA. National Snow and Ice Data Center. <https://doi.org/10.5067/W13AO54SS7CW>.